

〔用法用量〕 内服：煎汤，10～30g；入丸、散，每日3～6g。
外用：适量，调敷。

〔使用注意〕 脾胃虚弱者慎服。

1. 《医学入门·本草》：“畏磁石、石炭。”
2. 《本草求真》：“暂用则可，久用鲜效，且诸草药切忌。畏磁石、皂荚。”

3. 《中国药学大辞典》：“凡肾虚及气陷者禁用。”

〔附方〕 1. 治小儿身体壮热，急惊搐搦，涎潮壅塞，闷乱不醒 朱砂一钱（别研），铁粉二钱（别研），腻粉半钱（别研）。上药同研令匀。半岁儿每服一字，一岁儿服半钱，煎薄荷汤调下，不拘时候。（《杨氏家藏方》朱砂铁粉散）

2. 治风惊，心神不安 铁粉一两，光明砂一两，天竹黄一两，铅霜一两。上件药，细研如面。每服，不计时候，以竹沥调下半钱。（《圣惠方》铁粉散）

3. 治阳毒伤寒，发狂妄走者 铁粉、朴硝各一两，天竺黄半两，龙脑一分。上四味，研令匀细。每服二钱匕，鸡子清和水调下，不拘时。（《圣济总录》铁粉散）

4. 治脚气冲心 铁粉六七钱。水二杯，煎取一杯，饮。（《新本草纲目》）

5. 治疗疮 铁粉一两，蔓青根三两。捣如泥封之，日二换。（《纲目》引《集玄方》）

6. 治疗根不出 铁粉一两，轻粉一钱，麝香少许。为末，针画十字，以点药入内，醋调面糊敷之，极效。（《华佗神医秘传》）

7. 治大肠本虚，风毒客热乘之，脱肛红肿 铁粉研细，入白炭末，夹和敷之，按入。（《直指方》铁粉散）

8. 治子宫不收，名痲疾，有痛不可忍者 当归、磁石（酒浸），铁粉各等分。上为末，米饮调下，隔夜用角药，次日服此。角药用铁屑螺青为末，磨刀水调敷玉门上，灸。（《普济方》铁粉散）

9. 治贫血萎黄 铁粉3g，当归10g。共为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服5～10粒，白术汤送下。（《矿物药浅说》）

10. 治小儿肺经积热，涎盛咳嗽，睡卧不安 铁粉三钱，马牙硝四钱，蛤粉一两。上件为细末，每服一字，温养汁调下，乳食后临卧服。（《普济方》铁粉散）

11. 治消渴肝肺热，焦枯消瘦，或寒热口干，日夜饮水，小便如脂不止，欲死 水飞铁粉（绝燥者别研入）三两，鸡内金（阴干未入）五枚，牡蛎（熬，别研如粉入）二两，黄连三两。上四味，捣筛三五度，炼蜜为丸，饮汁下如梧子大五十丸。重者不过食时，轻者手下差。忌猪肉。（《外台》）

12. 治头痛鼻塞，头目不利 铁粉二两，龙脑半分。上药细研令匀。每于食后，以新汲水调下半钱。（《圣惠方》）

参考文献

化学成分

[1] 江苏新医学院. 中药大辞典(下册). 第1版. 上海科学技术出版社, 1977: 1855

0063 铁华粉 Tiehuafen

〔开宝本草〕

〔异名〕 铁艳粉、铁霜〔纲目〕。

〔品种考证〕 铁华粉始载于《开宝本草》，列为玉石部中品，谓：“作铁华粉法，取钢锻作叶，如笏或团，平面磨错，令光净，以盐水洒之，（投）于醋瓮中，阴处理之一百日，铁上衣生，铁华成矣。刮取，更细捣筛，入乳钵，研如面，和诸药为丸散。此铁之精华，功用强于铁粉也。”《品汇精要》云：“色，紫。”

按上述记载，铁华粉是金属铁与盐水、醋作用形成的醋酸亚铁。而《嘉祐本草》“铁华粉”条下按曰：“《日华子》云：铁胤粉

……其所造之法与华粉同，惟悬于釜甑上，就润地及刮取霜时，研淘去粗汁咸味，烘干。”《纲目》更将铁胤作为铁华粉异名，视为一物；但二者制作方法未尽相同，功能主治亦有异处，似不应列为异名，而属不同药物。

〔来源〕 为铁与醋酸作用形成的锈粉。

〔制法〕 将铁打成薄片，磨光后，洒上盐水，浸入醋瓮中，置阴凉处约百日，铁之表面生锈衣，取出刮下锈衣，研成细粉即成。

〔药材鉴别〕 性状鉴别 本品为粉末状，赤褐色。无金属光泽。体较重，触之易染手。气微，味酸。

以赤褐色、无杂质者为佳。

理化鉴别 (1) 取本品粉末少许，加硫酸后，加热，即分解发出醋酸的臭。（检查醋酸）

(2) 取本品粉末约0.1g，加稀盐酸5ml，使溶解后，滤过，滤液显亚铁盐的各种反应。参见“铁”条。

〔化学成分〕 为醋酸亚铁 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}]^{[1]}$ 。

〔药性〕 味咸，性平。归心、肝、肾经。

1. 《开宝本草》：“味咸，平，无毒。”

2. 《医林纂要·药性》：“酸，咸，寒。”

〔功能与主治〕 养血安神，平肝镇惊，解毒消肿。主治血虚萎黄，惊悸，癫狂，健忘，脱肛，痔漏。

1. 《开宝本草》：“主安心神，坚骨髓，强志力，除风邪，养血气，延年变白，去百病。随体所冷热，合和诸药用。枣膏为丸。”

2. 《本草汇言》：“推食积滞。”

3. 《医林纂要·药性》：“补心宁神，平肝定惊，止怒解毒。”

4. 《中国药学大辞典》：“疗疮疡，镇逆，解毒。”

〔用法用量〕 内服：入丸、散，0.3～1g。外用：适量，研末调敷。

〔使用注意〕 不可多服。过量则引起恶心，呕吐，食欲不振，胸闷，便秘。

《本草汇言》：“坚金之质，体重而降，急趋直下，少无留难，病非坚结，体非强壮能食之人，不可轻用。每次用不过四、五、六分。”

〔附方〕 1. 治贫血萎黄 铁华粉和枣肉捣烂为丸。开水送服1.5g。（《矿物药浅说》）

2. 治心虚风邪，精神恍惚，健忘 以经使铤铁四斤，于炭火内烧令通赤，投于醋中，如此七遍，即堪打碎如棋子大，以水二斗浸经二七日，每于食后服小盏。（《经验后方》）

〔集解〕 《本草图经》：“以铁拍作段片，置醋槽中，积久衣生，刮取之，为铁华粉。诸铁无正入丸散者，惟煮汁用之，华粉则研治极细，合和诸药。”

参考文献

化学成分

[1] 刘友樵. 矿物药与丹药. 第1版. 上海科学技术出版社, 1962: 57

0064 代赭石 Daizheshi

〔本经〕

〔异名〕 须丸〔本经〕，赤土〔说文〕，血师〔别录〕，丁头代赭〔本草图经〕，紫朱、赭石〔普济方〕，土朱〔直指方〕，铁朱〔纲目〕，钉头赭石、钉赭石〔中药志〕，赤赭石〔四川中药志〕。

〔释名〕 李时珍云：“赭，赤色也。代，即雁门也。今俗呼为土朱、铁朱。《管子》云：山上有赭，其下有铁。铁朱之名或缘此，不独因其形色也。”其余各名亦皆因其色而得之。

〔品种考证〕 本品始载于《本经》，原作“代赭”，列为下品。《别录》曰：“代赭生齐国山谷，赤红青色，如鸡冠有泽，染爪甲不渝者良。”《本草图经》曰：“今医家所用多择取大块，其上头有如浮沔丁者为胜，谓之丁头代赭。”李时珍曰：“赭石，处处山中有