

汤,用本品配以附子、干地黄、阿胶等;《妇人良方》“疗经血不止方”,亦用本品配以艾叶、生姜、生地黄等。

用于脾胃虚寒之呕吐、泄泻。伏龙肝质重而性温燥,有温脾暖胃,降逆止呕,燥湿止泻之功。治虚寒呕吐、反胃者,可单味应用。若配党参、半夏、生姜等同用,以增温中止呕之效;若妇女妊娠恶阻,常配苏梗、砂仁、白术等同用,以和胃,安胎。治脾虚泄泻不止,常配白术、干姜、煨肉豆蔻、五味子等同用,以温中涩肠止泻。

1.《得宜本草》:“得阿胶、蚕砂,治妇人血漏。得附子、黄芩、阿胶,治便后血。”

2.《得配本草》:“得醅调,敷阴肿。得鸡子清,调涂丹毒。”

【用法用量】 内服:煎汤,15~30g;布包煎汤,澄清代水用,60~120g;或入散剂。外用:适量研末调敷。

【使用注意】 出血、呕吐、泄泻属热证者禁服。

1.《本草经疏》:“阴虚吐血者不宜用,以其中有火气故也;痲毒盛难消者,不得独用。”

2.《本草从新》:“功专去湿,无湿勿用。”

【附方】 1.治下血,先便后血 甘草、干地黄、白术、附子(炮)、阿胶、黄芩各三两,灶中黄土半斤。上七味,以水八升煮取三升,分温二服。《金匮要略》黄土汤

2.治妇人血露 蚕沙一两,炒伏龙肝半两,阿胶一两。同为末,温酒调,空腹服二三钱,以知为度。《本草衍义》

3.治吐血、泻血、心腹痛 多年壁土,地炉中土,伏龙肝。上等分,每服一块如拳大,水二碗,煎一碗,澄清服,白粥补之。《普济方》伏龙散

4.治反胃 灶中土(用十余年者)。上为细末,米饮调下三二钱许。《百一选方》治翻胃单方

5.治阴证脱肛 伏龙肝一两,鳖头骨半两,百药煎二钱半。上三味,焙研为末,每用二钱至三钱,浓煎紫苏汤,候温和清油调涂患处,并如前法浴洗拭干方上药。《活幼心书·信效方》伏龙肝散

6.治泄痢后脱肛不收 伏龙肝、赤石脂等分。上末之,敷肠头上,或以槐花炒末陈米汤下。《丹溪摘玄》赤石脂散

7.治痲肿 伏龙肝以大酢和作泥,涂布上贴之,干则易之。《千金翼方》

8.治发背欲死 伏龙肝末之,以酒调,厚敷其疮口,干即易。《肘后方》

9.治乳痲 大黄、茜草、伏龙肝、生姜各二分。先以三物捣筛,又合生姜捣,以醋和涂,乳痲则止。《肘后方》乳痲方

10.治手足阳明经风热发为丹毒,面上赤肿,后渐渐由头而下,至身亦赤肿 灶心土、黄柏(炒)各三钱,冰片二分。为油末,鸡子清调搽。《外科真诠》伏龙散

11.治痲疮久烂 灶内黄土年久者,研细,入黄柏、黄丹、赤石脂、轻粉末,等分。清油调入油绢中贴之,勿动,数日愈。纵痒,忍之良。《纲目》引《济急方》

12.治聾耳 伏龙肝(研细)半两,以猪膏和拈如枣核大,绵裹塞耳中。日再易,夜一易。《圣济总录》

13.治孕妇一切有热,内外诸证,护胎法 伏龙肝为末,以井底泥调敷心下,令胎不伤。《济阴纲目》

【药论】 1.论伏龙肝温中以止血 ①倪朱谟:“伏龙肝,温脾渗湿,止大便秽血之药也。体虽土质,深得积年火气而成。性燥而平,气温而和,味甘而敛,以藏为用者也。故善主血失所藏。如《金匮》方之疗先便后血;《别录》方之止妇人血崩,漏带赤白;《蜀本草》之治便血血痢,污秽久延;杂病方之定心胃卒痛,故痲寐暴绝。他如藏寒下泄,脾胃因寒湿而致动血络,成一切失血诸疾,无用不宜尔。”(《本草汇言》) ②苏廷瑰:“伏龙肝,味辛气微

温,入脾与肝二经,有火上相生之妙用。治各证非漫然‘燥可去湿’之谓也。正欲用阳以化阴,俾湿化行而血乃化,风乃平。是其止血之功,皆由温中之力。阴虚失血者不宜用。”(《药义明辨》) ③杨时泰:“伏龙肝,所以治血症者,非以止涩为功,盖补其生化之厚,乃为固脱耳。推之女子崩带,男子洩精胥效矣,亦非用其燥也,更欲化阴以和阳。或曰:补土多用燥湿之剂,如白术等味与兹种何别,而迥殊若是。曰:治血症多不用术者,恐其燥阴而反剧耳。此味固用阳以化阴,非燥阴之剂也。”(《本草述钩元》) ④张秉成:“伏龙肝,质燥温脾而暖胃。远血良方。具土之质,得火之性,化柔为刚,味兼苦辛。其功专入脾胃,有扶阳退阴散结除邪之意。凡诸血病,由脾胃阳虚而不能统摄者,皆可用之,《金匮》黄土汤即此意。”(《本草便读》)

2.论伏龙肝和中止呕 张秉成:“伏龙肝,味辛散逆以和中。呕家圣药。”(《本草便读》)

【集解】 1.《雷公炮炙论》:“凡使,勿误用灶下土。其伏龙肝是十年已来灶额内火气积,自结如赤色石,中黄,其形貌八棱,取得后细研,以滑石水飞过两遍,令干,用熟绢裹却,取子时安于旧额内,一伏时,重研了用。”

2.《纲目》:“临安陈寅言:砌灶时,纳猪肝一具于上,俟其日久,与土为一,乃用之,始与名符。盖本于此。”

参考文献

化学成分

[1] 徐国钧,等.药材学,1963:767

[2] 李焱.矿物药浅说.第1版.济南:山东科学技术出版社,1981:239

药理

[1] 周济桂,等.天津医药杂志,1960,2(2):131

硅化合物类

0050 白石英 Baishiying (本经)

【释名】 “英”之言“瑛”也。“瑛”者,似玉之美石。李时珍曰:“徐锴云,‘英,亦作瑛,玉光也。’今五种石英,皆石之似玉而有光莹者。”

【品种考证】 白石英始载于《本经》,列为上品。《别录》谓:“白石英生华阴(今陕西省东部、渭河下游)山谷及太山,大如指,长二三寸,六面如削,白澈有光。”苏恭曰:“白石英所在皆有,今泽州(今山西省晋城一带)、虢州(今河南省西部)、洛州(今河北省邯郸、永年一带)山中俱出。虢州者大,径三四寸,长五六寸。今通以泽州者为胜也。”《本草衍义》云:“白石英状如紫石英,但差大而六棱,白色如水精。”《纲目》附图白石英即为六棱形。根据历代文献描述“六面如削,白澈有光”、“六棱,白色如水精”及附图所示,均符合氧化物类矿物石英的特点,故可以认为古今用药相符。

【来源】 为氧化物类石英族矿物石英。

【原矿物】 石英 Quartz

晶体结构属三方晶系。单晶体呈六方柱状,一端(或上、下两端)出现多个三角形晶面,晶面上常有水平条纹。但多数呈晶簇状、粒状等集合体产出。无色透明,或为白色、灰白色。晶面呈玻璃光泽,断面及块状体呈油脂光泽,光泽强度不一。透明至半透明,也有不透明者。无解理,断面呈贝壳状或不平坦。硬度7,相对密度2.65。性脆。具焦热电性及压电性。

完整的晶体产于岩石晶洞中;块状的常产于热液矿脉中;也是花岗岩、片麻岩、砂岩等各种岩石的重要组成部分。产于江