

附子一枚，硃砂一分(先将附子剝脐作孔，入硃砂于内，用生面作饼裹之，慢火煨令焦黄，去面，取附子、硃砂为末)，木香三钱，丁香三钱(二味同为末)。上件一处拌匀，面和为丸，每两作二十九，捏作饼子。每服一饼，用拇指大生姜一块，切作二破，置药在内，湿纸裹煨香熟，和姜细嚼，米饮送下，不拘时候。(《杨氏家藏方》硃附饼子)

4. 治妇人月水不通，脐腹积聚，或时疼痛，不思饮食 硃砂二两(于净生铁器内，用酸浆水二碗旋添，慢火熬水尽)，干漆一两(捣碎，炒令烟出)，桂心一两，没药一两，琥珀一两。上药捣罗为末，入硃砂都研令细匀，用糯米软饭和丸，如梧桐子大。每于食前，以温酒下二十九。(《圣惠方》硃砂丸)

5. 治痲疽发背，对口疔疮，痰核痞块，破烂恶疮，无名肿毒，能化腐消坚，生肌收口 鲜桃枝、柳枝、桑枝、槐枝各五尺，大山栝八十个，头发一两二钱，象皮、炒甲片各六钱。用麻油四斤，燥枯去渣，再熬至滴水成珠，后加入飞黄丹一斤半成膏，再加真硃砂三钱，血竭一钱，儿茶二钱，三味预研细，共搅极匀，出火气，听用。(《饲鹤亭集方》硃砂膏)

6. 治痲疽肿毒，瘰疬，疣痣 硃砂(生用)一钱，石矿灰一两(炒黄色)，白丁香三钱(炒黄色)，黄丹半斤(生用)，碱一斤(淋水五碗)。上先将前四味研极细末，次将碱水煎作一碗，成膏，待冷，以前末入膏和匀，贮瓷器中。(《证治准绳》硃砂膏)

7. 治疗疮 硃砂、雄黄、天南星、砒霜各等分，麝香少许。上研为细末。用竹针针开用药，到黄水出，疮已。(《宣明论方》)

8. 治瘰疬经久不瘥 硃砂一分，斑蝥三七枚(以糯米拌炒，米黄为度，去头、翅、足)，干漆半两(炒令黄色)，水马三七枚(去足，炒黄)，白芷半两，滑石一两，桂心半两。上药捣细罗为散。每服空心以粥饮调下一钱，晚食前再服。(《圣惠方》硃砂丸)

9. 治喉痹咽塞热痛 沙参、丹砂(研)、硃砂(研)、人参、玄参、丹参。上六味等分，捣研为末，炼蜜丸如鸡头实大。食后，临卧含一丸化之。(《圣济总录》二砂丸)

10. 治鼻生息肉 硃砂一钱，轻粉三分，冰片五厘，雄黄三分。上共为末。每日五六次点之，渐化为水。(《外科正宗》硃砂散)

11. 治积年痰肉翳障 琥珀半两，真珠末一两，珊瑚半两，朱砂半两，硃砂(白者)半两，马牙消半两，乌贼鱼骨半两(先于粗石磨去其涩，用好者一钱)。上药都入新钵内，研三日，令极细。每日三五度点之。(《圣惠方》琥珀散)

12. 治面上疣目，久不瘥 硃砂、硼砂、铁锈、麝香等分。研，搽三次。(《集效方》)

13. 治虫蜗入耳 硃砂(研)、胆矾(研)各一分。上二味研细。用鸡翎管吹一字许入耳。(《圣济总录》硃砂吹耳方)

【现代临床研究】1. 治疗慢性鼻炎 ①将硃砂用热水溶解，用活性炭脱色，制成纯品结晶，配成5%~7.5%的注射液。治疗时先以1%丁卡因棉片表面麻醉，然后于每侧鼻下甲注入硃砂液1ml，每星期1次，6次为1疗程。观察70例，结果治愈(自觉通气好，下鼻甲恢复正常大小)12例，好转(自觉通气好，下鼻甲稍缩小，偶用收缩药)51例，无效6例，加重1例^[1]。②用10%硃砂注射液，每侧1ml，作双侧下鼻甲游离缘粘膜下注射，观察192例，有效率为85.9%^[2]。

2. 治疗鸡眼 用硃砂2g，溶于2%普鲁卡因2ml中，密闭备用。先将患处用75%乙醇消毒，再以三棱针蘸药液2滴，滴于鸡眼中心，即将三棱针向中心点快速直刺，达基底部见血为止，最后用伴创膏敷盖，3~4d后除去。不愈者10d后再行治疗。观察100例，痊愈88例，好转12例。治愈者中最少治疗1次，最多5次，一般2~3次^[3]。

【药论】1. 论硃砂性猛，功专攻坚破积 ①李时珍：“硃

砂，大热有毒之物，噎膈反胃，积块内癥之病，用之则有神功。盖此疾皆起于七情饮食所致，痰气郁结，遂成有形，妨碍道路，吐食痛胀，非此物化消，岂能去之。”(《纲目》) ②缪希雍：“硃砂，乃卤液所结，乘阴毒之气，含阳毒之精。其味极咸、极苦、极辛，气温有毒，其主积聚结血宿冷者，以咸能入血软坚，辛能散结，温能除冷故也。积聚散则痛自止，气自下。因寒以致顽痰壅结，则作咳嗽，故暂用以散之。柔金化石之性，故能烂胎及去恶肉也。”(《本草经疏》)

2. 论硃砂性烈，用之宜慎 ①苏颂：“此本攻积聚之物，热而有毒，多服腐坏人肠胃，生用又能化人心为血，固非平居可饵者。”(《本草图经》) ②张洁古：“硃砂破坚癖，不可独用，须入群队药中用之。”(引自《纲目》) ③李时珍：“张果《玉洞要诀》云：北庭砂乘阴石之气，含阳毒之精，能化五金八石，去秽益阳，其功甚著，力并硫黄。独孤酒《丹房镜源》云：硃砂性有大毒，为五金之贼，有沉冷之疾则可服之，疾减便止。多服则成痲塞痲肿。二说甚明，而唐宋医方，乃有单服之法，盖欲得其助阳以纵欲，而不虞其损阴以发祸也。”(《纲目》)

【集解】1. 《本草拾遗》：“一飞为酸砂，二飞为伏翼，三飞为定精，色如鹅儿黄，和诸补药为丸，服之有暴热，飞炼有法，亦能变铁。”

2. 《四声本草》：“硃砂，使。生不宜多服，光净者良，今北庭为上。”

3. 《日华子》：“北庭砂，畏一切酸。凡修制，用石灰、黄丹作柜，煨亦使用。”

4. 《本草图经》：“边界出者，杂碎如麻豆粒，又夹砂石，用之须水飞澄去土石乞，亦无力，彼人谓之气砂。”

参考文献

化学成分

[1] 中国医学科学院药物研究所，等. 中药志(第四册). 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1961: 267

现代临床研究

[1] 吉林医科大学二院. 学术通讯, 1973
 [2] 金凤礼. 白求恩医科大学学报, 1980, 6(1): 120
 [3] 黑龙江伊春科技局. 新医药汇编. 1972: 62~63

镁化合物类

0013 滑石 Huashi
 《本经》

【异名】 管石(《南越志》), 液石、共石、脱石、番石(《别录》), 夕冷(《药性论》), 脆石、留石(《石药尔雅》), 画石(《本草衍义》), 活石(《中药志》)。

【释名】 《纲目》谓：“滑石性滑利窍，其质又滑腻，故以名之。管乃脂膏也，因以名县，脱乃肉无骨也，此物最滑腻，无硬者为良，故有诸名。”其软滑可作画，故谓之画石。滑石音转为活石。活、滑二字均属入声匣纽，韵亦相近，故能通假。

【品种考证】 滑石始载于《本经》，列为上品。《雷公炮炙论》云：“其白滑石如方解石……若滑石，色似冰，白青色，画石上有白腻文者，真也。”《本草经集注》曰：“滑石色正白，《仙经》用之以为泥。又有冷石，小青黄，性并冷利，亦能熨油污衣物。”《新修本草》曰：“……此石所在皆有，岭南始安(今广西桂林)出者，白如凝脂，极软滑，其出掖县(今山东莱州市)者，理粗质青白黑点，惟可为器，不堪入药。齐州南山神通寺南谷亦大有，色青白不佳，至于滑腻犹胜掖县者。”(《本草图经》)引《南越志》云：“管城县出管石，管石即滑石也……莱、濰州(莱州在今山东、濰州在今安