

折，痄腮，乳痈，疮疡肿毒，蛇虫咬伤。

1. 《生草药性备要》：“根同蟛蜞菊捣烂敷疮，洗烂脚亦效。”
2. 《本草求原》：“根止热咳。”
3. 《天宝本草》：“散寒清火，治脚膝疼痛，横行骨节并麻木，偏正头风。”
4. 《分类草药性》：“治跌打损伤，白带，筋骨痛，风湿麻木。”
5. 《湖南药物志》：“退热去风，舒筋活血。”
6. 广州部队《常用中草药手册》：“治感冒高热骨痛，风湿性关节炎，坐骨神经痛，咳嗽，胸痛，尿路结石。”
7. 《广西本草选编》：“祛风清热，消肿止痛。主治腹泻，骨鲠喉，乳腺炎。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30 g，大剂量可用至 60 g；或浸酒。外用：研末调敷，捣敷或煎水洗。

【宜忌】 孕妇慎服。

《贵州民间药物》：“忌生冷食物。”

【选方】 1. 治咳嗽及哮喘 刺三加根 15 g，倒生根 15 g，葵花杆心 15 g。煎水服。（《贵州民间药物》）

2. 治胃痛 篓钩菜老根 60 g（斩碎），白米 15 g。置锅中炒至米转深黄色，掺入清水 1 碗，煮至微温，一次慢慢服下。（《阳春草药手册》）

3. 治黄疸 鲜（白簕花）根 120 g，鲜白萝卜 60 g，冰糖 15 g。水煎服。（福州军区《中草药手册》）

4. 治风湿关节痛 （白簕花）根 30~60 g。酌加酒水各半炖服。

5. 治坐骨神经痛 （白簕花）根 120 g，虾蟆 4 个（去肠内杂物），酌加清水炖服。（4、5 方出自《福建民间草药》）

6. 治腰痛 白簕花根 500 g。切片晒干，炒黄，加红酒 1 000 ml，浸 1 星期。每日 3 次，每次 1 匙饮酒。（《福建药物志》）

7. 治骨折 （白簕）根皮适量，捣碎，加酒调匀，微炒热，包伤处。（《贵州民间药物》）

8. 治月经困难，白带 白簕 9 g，红牛膝 6 g。水煎服。（《湖南药物志》）

9. 治小儿麻痹证初期 鲜（白簕花）根 120 g，薏苡仁、赤小豆各 60 g。水煎服。（福州等区《中草药手册》）

10. 治乳痈乳吹 （白簕花）根 30~60 g。酌加红薯烧酒炖服。（《福州民间药物》）

11. 治湿疹 （白簕）根 30 g，炖猪肥肉服；另取（白簕）根适量，水煎外洗。（《福建药物志》）

12. 治毒蛇或蜈蚣咬伤 鲜白簕花根，洗净，加适量烧酒，擂烂绞汁（或泡酒备用），搽肿处，渣敷伤口周围。重者可服 30~40 ml。（《常用中草药选编》）

0106 三加花 sān jiā huā （《福建民间草药》）

【基原】 为五加科五加属植物白簕 *Acanthopanax trifoliatus* (L.) Merr. 的花。

【原植物】 参见“三加皮”条。

【采收加工】 8~11 月采摘，鲜用。

【功用主治】 解毒敛疮。主治漆疮。

【用法用量】 外用：煎汤洗。

0107 三百银 sān bǎi yín （《全国中草药汇编》）

【异名】 白杜仲、中叶杜仲（《云南中草药》），婆婆针线包

（《全国中草药汇编》）。

【基原】 为萝藦科牛奶菜属植物牛奶菜的全株或根。

【原植物】 牛奶菜 *Marsdenia sinensis* Hemsl.

粗壮木质藤本。枝条、叶下面、叶柄、总花梗、花梗、花萼、花冠内面、蓇葖果均被黄色绒毛。叶对生；叶柄长约 2 cm；叶片卵圆状心形，长 8~12 cm，宽 5~7.5 cm，先端短渐尖，基部心形。伞形状聚伞花序腋生，着花 10~20 朵；花萼 5 裂，内面有腺体 10 余个；花冠白色或淡黄色；副花冠片短，仅达雄蕊之半；花粉块每室 1 个，肾形，直立；柱头先端 2 裂。蓇葖果纺锤形，向两端渐尖，长约 10 cm，直径 2.5 cm。种子卵圆形，扁平，种毛长约 4 cm。花期夏季，果期秋季。

生于海拔 300 m 以下的山谷疏林中。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川等地。

【采收加工】 7~10 月采收，切段，晒干。

【药材】 三百银 *Herba seu Radix Marsdeniae Sinensis* 产于湖南、浙江、江西、湖北、福建、广东等地。

性状 本品呈长短大小不规则的段块状。根呈圆锥形，段节疙瘩块状，常带须根，表面灰黄色，散布不规则的皮孔；断面木质部呈角状，黄白色；质坚硬；无臭，味微涩。茎呈圆柱形，段节状；老茎表面灰黄色，散布不规则的圆形皮孔，有时附有苔藓植物，幼茎表面绿黄色，密被绒毛；断面多为斜向切面，木质部圆形，菊花心，黄白色；老茎中心髓部较小，幼茎草质松脆而折断面纤维状，无臭气；味微涩。叶呈折叠不规则切块状，上表面灰绿色，下表面绿黄色，密被绒毛，质脆，无臭，无味。果呈横切条块状，长 2~5 cm；外表面凸，内表面凹；外表面黄绿色，密被绒毛，内表面白色光滑；断面外侧纤维状，中部海绵状，内侧木质，无臭，无味。

鉴别 取本品粉末 1 g，加甲醇 10 ml，水浴回流提取 20 min，过滤，滤液挥干，残留物加冰醋酸溶解，加浓硫酸呈现紫红色，立即变为污绿色。另取甲醇溶液滴于滤纸上，喷洒三氯化锑的氯仿饱和液，置 90 °C 干燥箱内加热，立即呈现紫红色斑点（检查甾体类成分）。

【成分】 全草含三萜和脂肪烃类。三萜类： α -香树脂醇乙酸酯（ α -amyrin acetate），羽扇豆醇乙酸酯（lupenyl acetate）^[1]， α -香树脂醇丁酸酯（ α -amyrin butyrate）和 α -香树脂醇丙酸酯（ α -amyrin propionate）^[2]。脂肪烃类：三十一烷（hentriaccontane），二十九烷（nonacosane）和三十三烷（tri-triacontane）^[1]。

【药性】 《云南中草药》：“微苦，平。”


【功用主治】 祛风湿，强筋骨，解蛇毒。主治风湿性关节炎，跌打扭伤，毒蛇咬伤。

1. 《云南中草药》：“根，舒筋活络，行气止痛。主治腰肌扭伤，风湿关节炎，跌打损伤。同草乌共煎，可减轻草乌之毒。”

2. 《全国中草药汇编》：“全株，壮筋骨，健胃利肠。”

【用法用量】 内服：煎汤，9~15 g；或泡酒。

【选方】 治腰肌扭伤，风湿性关节炎，跌打损伤 白杜仲



牛奶菜