

(6''-crotonyl)- β -D-glucoside], 山柰酚-3-O-(6''-巴豆油酰基)- β -D-葡萄糖苷 [kaempferol-3-O-(6''-crotonyl)- β -D-glucoside], 山柰酚-3-O- β -D-葡萄糖苷 (kaempferol-3-O- β -D-glucoside), 槲皮素-3-O- β -D-葡萄糖苷 (quercetin-3-O- β -D-glucoside); 三萜类: 丁香苷 (syringin), 丁香苷甲醚 (syringin methylether), β -香树脂醇棕榈酸酯 (β -amyrin palmitate), 羽扇豆醇 (lupeol), 羽扇豆醇乙酸酯 (lupeol acetate), 羽扇豆醇棕榈酸酯 (lupeol palmitate), 二十四烷酸 (tetracosanoic acid)^[3], 1(α)12 α 环氧蒲公英赛酮 [1(α)12 α -oxidotaraxerone]; 木脂素: 泊草苷 (sanssurenoside)^[4]。

【药理】 1. 抗炎作用 八楞木提取物能降低醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性增高, 及二甲苯引起的小鼠皮肤毛细血管通透性增高, 对二甲苯引起的小鼠耳壳炎性肿胀及新鲜蛋清大鼠足肿胀有显著抑制作用^[1]。

2. 抗变作用 小鼠骨髓细胞染色体畸变试验、姐妹染色单体交换试验、小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验均表明风毛菊提取物有一定的抗诱变作用^[2]。

毒性 水提物 LD₅₀ 为 208.19 k/kg, 毒性极低^[1]。

【药性】 苦、辛, 平。

1. 《饮片新参》: “苦, 平。”

2. 《贵州草药》: “性寒, 味苦、辛。”

3. 《全国中草药汇编》: “苦、辛, 温。”

【功用主治】 祛风活络, 散瘀止痛。主治风湿痹痛, 跌打损伤。

1. 《饮片新参》: “活血祛风, 散瘀止痛。”

2. 《全国中草药汇编》: “祛风活络, 散瘀止痛。主治风湿关节痛, 腰腿痛, 跌打损伤。”

3. 《广西民族药简编》: “治牙龈炎。”

4. 《浙江药用植物志》: “清肺, 止咳。主治烦热口渴, 鼻干咽燥, 热咳烦闷。”

【用法用量】 内服: 煎汤, 9~15 g; 或浸酒。外用: 捣敷; 或煎水洗。

【宜忌】 《全国中草药汇编》: “孕妇忌服。”

【选方】 治烦热咳嗽 (八楞木) 全草 30 g, 蓬蘽 21~24 g, 桔梗 6~9 g。水煎服。《浙江药用植物志》

0047 八角枫叶 bā jiǎo fēng yè (《南宁市药物志》)

【异名】 大风药叶(《玉溪中草药》)。

【基原】 为八角枫科八角枫属植物八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms 或瓜木 *A. platani folium* (Sieb. et Zucc.) Harms 的叶。

【原植物】 参见“八角枫根”条。

【采收加工】 6~9 月采收, 鲜用或晒干研粉。

【成分】 1. 八角枫 叶中含有 β -香树脂醇乙酸酯 (β -amyrin acetate), 三十烷醇 (triacontanol), β -谷甾醇 (β -sitosterol)^[1], 2'-O- β -D-吡喃葡萄糖基水杨苷 (2'-O- β -D-glucopyranosylsalicin) 和 2'-O- β -D-吡喃葡萄糖基-6'-O- β -D-吡喃木糖基水杨苷 (2'-O- β -D-glucopyranosyl-6'-O- β -D-xylopyranosylsalicin)^[2]。

2. 瓜木 叶含瓜木苷 (platanionosides) D~J^[3]。

【药性】 苦、辛, 平。小毒。归肝、肾经。

1. 《四川中药志》1960 年版: “性平, 味辛, 有小毒。”

2. 《安徽中草药》: “性微温, 味辛, 有毒。”

【功用主治】 解毒消肿, 化瘀止痛。主治疮肿, 乳痈, 乳头皲裂, 漆疮, 疥癣, 鹤膝风, 跌打瘀肿, 骨折, 外伤出血。

1. 《贵阳民间药草》: “治乳结疼痛, 刀伤出血。”

2. 《四川中药志》1960 年版: “嫩枝叶治风湿腰腿疼痛麻木。”

3. 《广西本草选编》: “治漆疮。”

4. 《青岛中草药手册》: “治无名肿毒, 疥癣。”

【用法用量】 外用: 鲜品捣敷; 煎汤洗; 研末撒。

【选方】 1. 治乳结疼痛 八角枫叶数十张, 抽去粗筋, 捣烂敷中指 (左乳痛敷右中指, 右乳痛敷左中指), 轻者 1 次, 重者 3 次。《贵阳民间药草》

2. 治乳头皲裂 鲜大风药叶适量, 捣烂包中指。《玉溪中草药》

3. 治漆疮 八角枫叶适量, 煎汤外洗。《广西本草选编》

4. 治鹤膝风初起 鲜八角枫叶捣烂, 加醋调敷患处, 干则更换。《安徽中草药》

5. 治刀伤出血 八角枫叶为细末, 撒于伤口上, 可防止破伤风。《贵阳民间药草》

【临床报道】 治疗踝部急性扭伤 取八角枫叶适量, 研细末, 与醋调成糊状, 敷于患处, 每日换药 1 次。共治 81 例, 结果全部治愈, 用药最短 1 d, 最长 7 d, 平均治疗时间 3 d^[1]。

0048 八角枫花 bā jiǎo fēng huā (《四川中药志》)

【异名】 牛尾巴花(《浙江民间常用草药》)。

【基原】 为八角枫科八角枫属植物八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms 和瓜木 *A. platani folium* (Sieb. et Zucc.) Harms 的花。

【原植物】 参见“八角枫根”条。

【采收加工】 5~7 月采花, 晒干。

【药性】 辛, 平。有小毒。

【功用主治】 治头风痛及胸腹胀痛。

【用法用量】 内服: 煎汤, 3~10 g; 或研末蒸鸡蛋服。

【选方】 治胸腹胀满 八角枫花 9 g, 水煎服。《青岛中草药手册》

0049 八角枫根 bā jiǎo fēng gēn (《简易草药》)


【异名】 白龙须(《简易草药》), 白金条(《分类草药性》), 白筋条(《四川中药志》)。

【基原】 为八角枫科八角枫属植物八角枫和瓜木的根、须根及根皮。

【原植物】 1. 八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms [*Stylidium chinense* Lour.]

又名: 八角金盘(《本草从新》), 木八角(《纲目拾遗》), 五角枫(《简易草药》), 华瓜木(《中国植物图鉴》), 水芒树(《岭南校园植物名录》), 榧木(《经济植物手册》), 八角梧桐、六角金盘、花冠木(《浙江药用植物志》)。

落叶乔木或灌木, 高 3~5 m。树皮平滑, 灰褐色。单叶互生; 叶柄长 2.5~3.5 cm; 叶纸质, 近圆形或



八角枫