

6. 治喉闭,水饮不入 (入地金牛根)擂烂,同黄糖煮,做成弹子,含化。(《本草求原》)

7. 治龋齿痛 两面针根皮研粉,置痛处;或用根3~9 g,水煎含漱。(《广西本草选编》)

8. 治烫伤 先用两面针煎水洗,洗后用两面针干根研粉,撒布患处。(《广西实用中草药新编》)

9. 治毒蛇咬伤 (两面针)鲜根30 g,水煎服;另用鲜根磨酒外敷。(《福建中草药》)

【临床报道】 1. 止痛 用入地金牛注射液每次肌注2 ml(相当于根3 g),每日1~2次。治疗神经痛、头痛、风湿痛、胃肠绞痛500余例,一般用药后5~10 min即可止痛^[1]。也有用入地金牛注射液肌内注射,每次1 ml(含有效成分100 mg),每日1次,治疗风湿性及类风湿关节炎189例,有效率在90%以上,多数患者在用药5~6 d内显示效果^[2]。

2. 麻醉 将两面针制成表面麻醉剂,用于口腔科手术,局部用药1~2 min后便可进行手术^[3]。拔牙101只(84例),无痛98只;齿龈脓肿切开18例,无痛14例^[4]。

3. 治疗溃疡病 用溃疡丸(由山竹树皮、两面针制成蜜丸,每丸重10 g),每次1丸,每日服3次。20~25 d为1个疗程,服至溃疡愈合或瘢痕形成为止。共治疗各种溃疡60例,服药后溃疡愈合者47例(占78.3%),无变化或未形成瘢痕者13例(占21.7%)^[5]。

4. 治疗复发性阿弗他溃疡 用入地金牛的叶片或根(从干燥切成薄片黄色的根中提取深黄色透明液与白及胶制成药膜,每片药膜为1 cm×1 cm正方形,厚约70 μm,含生药量5 mg,呈深褐色,质地柔软,与水接触后即溶成胶状物,药物成分易被释放和吸收。于口疮发病第二日使用,用时按溃疡大小剪取药膜一片,直接敷于患处,每日3~4次。共治疗58例。结果:显效37例,有效21例。溃疡一般用药3~5 d即可愈合^[6]。

5. 治疗带状疱疹 治疗组将入地金牛酊(入地金牛10 g加入75%乙醇100 ml浸泡1星期后,去渣过滤)加入纱块,以取出的纱块不滴液为度,用1~2层敷患处。继以神灯(高效电磁波治疗仪)照射患部,每日1次,每次30 min。照射时,患部纱块干后可再加药液,治疗早期酌情服用中药汤剂(生苡仁、仙灵脾、大青叶、蒲公英、紫草、白芍、郁金、延胡索、珍珠母、石决明、寮刀竹、甘草)。对照组口服吗啉胍(ABOB)、VB₁、吲哚美辛,肌注聚肌胞等。结果:治疗组261例,治愈149例,显效85例,有效27例,总有效率89.7%;对照组107例,治愈59例,显效30例,有效18例,总有效率83.17%。另观察到治疗组具有缩短病程及明显的止痛效果,止疱时间与皮损干涸结痂时间均短于对照组^[7]。

0069 入地蜈蚣 rù dì wú gōng 《广西药用植物图志》

【异名】 倒地蜈蚣、蜈蚣草、倒麒麟、地蜈蚣、过路蜈蚣、过路鹅江(《台湾药用植物志》)。

【基原】 为七指蕨科七指蕨属植物七指蕨的根茎或全草。

【原植物】 七指蕨 *Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook. [*Botrychium zeylanicum* L.; *Osmunda zeylanica* L.]

多年生草本,植株高30~50 cm。根茎横走而粗壮,多数肉质。近顶部生出1~2枚叶;叶柄长20~40 cm,绿色,革质,基部有2片托叶;由顶部生出不育叶和孢子囊穗。不育

叶通常为掌状三叉,长宽各15~25 cm,每叉由1片顶生羽片和1~2对侧生羽片组成;羽片革质,披针形,长10~18 cm,宽2~4 cm,先端渐尖,基部楔形,下延,边缘全缘或稍具不整齐锯齿。孢子囊穗单生,通常高出不育叶,有6~8 cm的柄,穗长达13 cm;孢子囊无柄,3~5枚聚生于囊托上,呈细长圆柱形,先端有不育的鸡冠状突起。

生于湿润疏林下或沟边湿地。分布于广西、海南、云南、台湾等地。

【采收加工】 7~11月采挖,切段,晒干或鲜用。

【成分】 根含入地蜈蚣素(ugonin) A、B、C、D^[1, 2], 又含豆甾醇(stigmasterol), 岩蕨甾醇(fucosterol), 卫矛醇(dulcitol)^[3]。

【药性】 《广西民间常用草药》:“味苦、微甘,性凉。”

【功用主治】 清肺化痰,散瘀解毒。主治咳嗽,哮喘,咽痛,跌打肿痛,痈疮,毒蛇咬伤。

1. 《广西民间常用草药》:“清热化痰。治痨热咳嗽、跌打内伤。”

2. 广州部队《常用中草药手册》:“主治咽炎,扁桃体炎,咳嗽。”

3. 《广西本草选编》:“润肺化痰,消肿解毒。主治慢性支气管炎,哮喘,跌打肿痛,痈疮,蛇伤。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g。外用:捣敷。

【选方】 1. 治痨热咳嗽 入地蜈蚣15 g,猪肺120 g,用水煲汤服。(《广西民间常用草药》)

2. 治跌打内伤,散瘀止痛 入地蜈蚣,童便浸49 d,洗净晒干,研末,每服1.8 g,酒或开水送下。(《广西药用植物图志》)

0070 九牛造 jiǔ niú zào 《陕西中草药》

【异名】 震天雷(南川《常用中草药手册》),九牛七、翻天印(《陕西中草药》),柳州七(《全国中草药汇编》)。


【基原】 为大戟科大戟属植物湖北大戟的根。

【原植物】 湖北大戟 *Euphorbia hyalina* Hand.-Mazz. 又名:西南大戟(《湖北植物志》)。

多年生草本,高25~100 cm。根圆锥状,直径达15 mm。茎直立。叶互生;叶柄极短;叶片倒披针形至狭卵形,长5.5~10 cm,宽1~2 cm,先端钝圆或微尖,基部楔形,全缘,下面淡绿色。杯状聚伞花序顶生或腋生,顶生者有细长花梗2~5,下部有轮生苞叶3~5;腋生者花梗细长,单生,苞叶2~3;总苞4



七指蕨



湖北大戟