

**性状** 根呈圆柱形，少分枝，扭曲不直，长10~25 cm，直径0.5~1.5 cm。顶部有密集的点状茎痕。表面灰黄色，全体具纵皱纹，质硬而脆，易折断。断面较平坦，可见明显的形成层。木质部黄色，木化程度较强，气微，味淡而微甜。

**鉴别** 根横切面：木栓层为数列木栓细胞，壁微木化。皮层薄壁细胞切向延长。韧皮部乳管群较稀疏，放射状排列，内含淡黄色分泌物；石细胞单个或成群散在。形成层明显。木质部导管单个或数个成群呈放射状排列，中心导管较密集，导管圆多角形。薄壁细胞中含菊糖。

**【药性】** 甘，平。归脾、肺经。

1. 《草木便方》：“甘，平，温。”
2. 《广西中药志》：“味甘微苦，性温，无毒。”

3. 《青藏高原药物图鉴》：“甘、涩，温。”

**【功用主治】** 健脾益气，补肺止咳，下乳。主治虚劳内伤，气虚乏力，心悸，多汗，脾虚泄泻，白带，乳汁稀少，小儿疳积，遗尿，肺虚咳嗽。

1. 《草木便方》：“下乳，补土化痰能生金，益精养神安五脏，虚劳内伤真气生。”

2. 《民间常用草药汇编》：“下乳，定喘，补气血。”

3. 《广西中药志》：“润肺、生津。治肺气虚咳嗽及身体衰弱。”

4. 广州部队《常用中草药手册》：“补虚益气。主治病后体虚，疲劳倦怠，多汗，食欲不振，心跳不宁，肺结核，夏季热。”

5. 《贵州民间方药集》：“祛痰止咳。”

6. 《青藏高原药物图鉴》：“滋补，利尿，治肾炎，营养不良性水肿。”

7. 《湖北中草药志》：“用于气虚乏力，脾虚久泻，食欲不振，神经衰弱，小儿遗尿，乳汁缺少，白带等症。”

8. 《福建药物志》：“主治小儿疳积，痈疽难溃，毒蛇咬伤，遗精。”

**【用法用量】** 内服：煎汤，15~30 g；干品9~15 g。外用：鲜品捣烂敷。

**【选方】** 1. 治脾胃虚弱、倦怠 (金钱豹)根15~60 g。水煎服。《湖南药物志》

2. 治虚劳 土党参60 g，糯米300 g。水煎服。

3. 治多汗、心悸 土党参15 g。水煎服。(2、3方出自《湖北中草药志》)

4. 治脾虚泄泻 土党参15~30 g，大枣9~15 g。水煎服。《福建中草药》

5. 治小儿疳积 鲜土党参30 g，白糖适量，水煎服，或取汤冲鲜鸡蛋1枚服。土党参15 g，仙茅4~6 g，猪瘦肉60 g。炖服。《福建药物志》

6. 治小儿遗尿 土党参根60~120 g，猪瘦肉120 g。水炖，服汤食肉。《江西草药》

7. 治白带(气虚证) 金钱豹根30 g，胭脂花根、扁豆各15 g。炖肉服。《西昌中草药》

8. 治肺痿声哑 (土党参)鲜根90 g，猪肺一具。炖服。《闽南本草》

9. 治寒咳 土党参根60 g，白胡椒、艾叶各15 g。水煎服。《江西草药》



土党参(根)  
外形

10. 治乳汁少 土党参30 g。煮猪脚食。《湖南药物志》

11. 治痈疽难溃 鲜土党参60 g，冰糖6 g。水煎服；渣捣烂敷患处。《福建药物志》

12. 治神经衰弱 金钱豹60 g。煎水加冰糖少许，冲服。《西昌中草药》

13. 治外伤出血 牛尾参适量。研末撒于患处。《云南中草药》

0166 **土常山** tǔ cháng shān  
(《本草图经》)

**【异名】** 大叶土常山、大叶老鼠竹(《天目山药用植物志》)，硬毛绣球、癞疮树(《四川中药志》)，白常山、白花常山(《湖南药物志》)，鸡跨裤(《贵州中草药名录》)。

**【基原】** 为虎耳草科绣球属植物腊莲绣球和伞形绣球的根。

**【原植物】** 1. 腊莲绣球 *Hydrangea strigosa* Rehd. 又名：蜜香草(《本草图经》)，腊莲(《中国树木分类学》)。

灌木，高2~3 m。小枝圆柱状，被白色平贴硬毛，老时灰褐色。单叶对生；叶柄长1~5 cm；叶片披针形、椭圆状披针形或倒卵形，长20~30 cm，宽2~8 cm，先端渐尖，基部楔形或圆形，边缘具细锯齿，齿端有硬尖，上面绿色，下面灰色，两面均具平贴硬毛。聚伞花序顶生，花梗密被平贴硬毛；花二型；外缘为不育花，萼片4，花瓣状，白色或紫色，径2~4 cm；中央为育性花，白色，萼筒与子房合生，被稀疏平贴硬毛，萼片三角形；花瓣5，长方卵形，镊合状排列，雄蕊10；雌蕊1，子房下位，花柱2，柱头头状。蒴果，半球形，有棱脊。种子细小，两端有翅，黄褐色。花期5~8月，果期8~9月。

生于海拔900~1500 m的山坡溪边及林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州、陕西、甘肃等地。

2. 伞形绣球 *H. angustipetala* Hayata [*H. umbellata* Rehd.] 又名：伞花八仙(《天目山药用植物志》)。

本种与腊莲绣球的区别在于：小枝、叶柄无开展的柔毛。叶片狭椭圆形或狭长圆形，长达15 cm，两面均被毛。花序的一回分枝伞状排列，无花序轴。种子无翅。花果期6~9月。

生于海拔500~1850 m的山坡疏林内、溪边或林缘。分布于安徽、浙江、江西、福建、湖南、广西、台湾等地。

上述植物的幼叶(甜茶)亦供药用，另设专条。

**【采收加工】** 9月至翌年2月间采挖，鲜用；或擦去栓皮，切段，晒干。

**【药材】** 土常山 *Radix Hydrangeae Strigosae* 产于浙江、四川等地。

**性状** 根圆柱形，常弯曲，有分枝。表面深棕黄色，具纵皱纹及支根痕；粗皮除去者，呈淡黄色，具纵纹。质坚硬，不易折断，断面黄白色。气微，味苦。



腊莲绣球