

低浓度(1:300 或 1:100)时有改善心肌收缩力的作用,高浓度时(1:10)作用相反;土麦冬任氏液对洋地黄中毒的心肌有恢复心肌收缩力的作用^[4,5]。土麦冬水醇剂2.5 g/kg 静脉注射,对氯仿、肾上腺素诱发家兔心律失常有明显的对抗作用。同等剂量的土麦冬水醇剂静注可明显提高乌头碱诱发大鼠室颤和心脏停搏的阈剂量。此外,本品 30 g/kg 静脉注射可引起家兔正常 ECG 改变,表现为 P-R 间期延长, Q-T 间期缩短,心率减慢及 T 波低平^[5]。

【药性】《香港中草药》:“味甘、微苦,性微寒。”

【功用主治】养阴生津。主治阴虚肺燥,咳嗽痰黏;胃阴不足,口燥咽干,肠燥便秘。

1.《广西民族药简编》:“治干咳无痰,月经过多。”

2.《香港中草药》:“养阴生津,润肺止咳。主治肺结核,慢性支气管炎,慢性咽炎的阴虚干咳;热病伤津,心烦,口渴,咽干,便秘。”

【用法用量】内服:煎汤,10~15 g。

0156 土良姜 tǔ liáng jiāng (《昆明药用植物调查报告》)

【异名】野姜、良姜(《云南中草药》)。

【基原】为姜科姜花属植物草果药 *Hedychium spicatum* Ham. ex Smith 的根茎。

【原植物】参见“草果药”条。

【采收加工】9~10月采收,鲜用或切片晒干。

【成分】根茎含草果药烯酮(hedychenone)^[1,2], 7-羟基草果药烯酮(7-hydroxyhedychenone)^[3], 6-氧代半日花-7, 11, 14-三烯-16-酸内酯(6-oxolabda-7, 11, 14-triene-16-oic acid lactone)^[4], 谷甾醇(sitosterol), 谷甾醇 β-D-葡萄糖苷(sitosterol β-D-glucoside), 柳杉二醇(cryptomeridiol)^[5]。另含脂肪酸及酯:棕榈酸二十六烷酯(ceryl palmitate), 十四烷酸(myristic acid), 棕榈酸(palmitic acid), 硬脂酸(stearic acid), 油酸(oleic acid), 亚油酸(linoleic acid), 亚麻酸(linolenic acid)^[6]。

【药性】《云南中草药》:“辛、苦,温。”

【功用主治】温中,理气,止痛。主治胃寒痛,消化不良,膝关节痛。

1.《昆明药用植物调查报告》:“治气痛,胃痛,腹痛。”

2.《云南中草药》:“温胃散寒,燥湿。治胃寒痛,消化不良,疟疾。”

【用法用量】内服:煎汤,3~9 g。外用:鲜品捣敷。

0157 土阿魏 tǔ ā wèi (汪连仕《采药书》)

【基原】为马鞭草科大青属植物海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. 根皮捣取的液汁凝结而成。

【原植物】参见“臭梧桐”条。

【采收加工】7~9月挖取根,剥取根皮,捣汁,放置干燥。

【功用主治】宽筋活血,化痞消癥。

0158 土附子 tǔ fù zǐ (《纲目拾遗》)

【异名】土附卵(《中国动物药志》)。

【基原】为塘鳢科沙塘鳢属动物沙塘鳢 *Odontobutis obscura* (Temminck et Schlegel) 的卵。

【原动物】参见“土附”条。

【采收加工】4~6月捕捉,取卵。

【药性】咸,平。

【功用主治】助相火,开胃,利水。主治肾虚阳痿,消化不良,水肿。

《食物考》:“开胃,利水。”

【用法用量】内服:煮食。

【宜忌】《食物考》:“小儿戒食。”


0159 土细辛 tǔ xì xīn (《质问本草》)

【异名】杜细辛(《土宿本草》)。

【基原】为马兜铃科细辛属植物双叶细辛、单叶细辛、川北细辛、福建细辛、川滇细辛等的全草。

1. 双叶细辛 *Asarum caulescens* Maxim. 又名:毛叶细辛、乌金草(《湖北植物志》)。

多年生草本。根茎横走,节间长 3~5 cm。地上茎匍匐。叶柄长 6~12 cm;芽胞叶近圆形,边缘密生睫毛;叶片近心形,长 4~9 cm,宽 5~10 cm,先端常具 1~2 cm 的尖头,基部心形,两侧裂片常向内弯接近叶柄,两面散生柔毛,下面毛较密。花紫色;花梗长 1~2 cm,被柔毛;花被裂片三角状卵形,开花时上部向下反折;雄蕊和花柱上部常伸出花被之外,花丝比花药长约 2 倍,药隔锥尖;



双叶细辛


子房近下位,略成球状,花柱先端 6 裂,裂片倒心形,柱头着生于裂缝外侧。蒴果近球状。花期 4~5 月。

生于林下阴处。分布于陕西、甘肃、湖北、四川、贵州等地。

2. 单叶细辛 *A. himalaicum* Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch. 形态、生境与分布参见“水细辛”条。

3. 川北细辛 *A. chinense* Franch. [*A. fargesii* Franch.] 又名:莲花细辛(《全国中草药汇编》),中国细辛、城口细辛(《湖北植物志》)。

形态与双叶细辛相似,其特点是:叶片椭圆形或卵形,稀心形,长 3~7 cm,宽 2.5~6 cm,先端渐尖,基部耳状心形,上面绿色,或叶脉周围白色,形成白色网纹,下面浅绿色或紫红色。花紫色或紫绿色;花被管球状或卵球状,喉部缢缩,膜环宽约 1 mm,内壁有格状网眼,花被裂片宽卵形,基部有密生细乳突排列成半圆形;花丝极短,药隔不伸出或稍伸出;子房近上位或半下位,花柱离生,柱头着生花柱先端或几近先端。花期 4~5 月。



川北细辛

生于林下或山谷阴湿地。分布于湖北、四川。

4. 福建细辛 *A. fukiense* C. Y. Cheng et C. S. Yang 又名:土里开花、薯叶细辛、马脚蹄(《中国植物志》)。

形态与上种相似,其特点是:根茎短。叶柄、叶片下面、花