

故其性大寒。其熟地黄，乃后人复蒸晒者，诸家《本草》皆指干地黄为熟地黄，虽主治证同，而凉血补血之功稍异。”

6. 《得配本草》：“得元参定精意，得竹茹息惊气，麦冬为佐，复脉内之阴，当归为佐，和少阳之血；配地龙治鼻衄交流，佐天门冬引肺气入生津之处，使羚羊角起阴气，固封蛰之本，使通草导小肠郁热，调鸡子白治胎动，调蜜酒治热传心肺；君茯苓除湿热伤脾，和车前汁治血淋。”

7. 《本草求原》：“干地黄乃补宣并行，为因虚得实之良药。古方黄芩汤治心劳实热，小甘露饮治脾劳寒热，地黄汤治肾劳实热，麦冬汤治脉实极为病咸用之。夫既曰虚劳而又曰实者何也？《经》曰精气夺则虚，邪气盛则实，因精虚以致邪实而益致精虚，故宜此宣邪以补虚，而后乃用纯补，方有次序。”

8. 《本经疏证》：“地黄之用在其脂液，能荣养筋骸血络，干者枯者，能使之润泽矣。进乎此，则因干枯而断者，得润泽而仍能续。故地黄之用不在通而在能养，盖经脉筋络干则收引，润则弛长，是养之所以续之。《本经》疗跌折绝筋，仲景治脉结代，胥是意也。”

9. 《本草正义》：“（地黄）作汤以除寒热积聚，除痹，则言其入煎剂尤为流动活泼，所以积聚痹着皆除。此以补养为磨积之计，乃正气旺而病自退，非谓地黄滋补之药，竟能消积通痹也。盖气血不充，津液不布，则仍似此坚硬固结之病，必无可愈之理，所以积聚癥瘕痞积等证，均宜且补且行，斟酌进退，缓以图之，自可徐收效果。若仅读张子和书，止知攻破为长，不顾正气，日事峻削，甚至愈攻愈坚，纠结不解，以速其危者，其亦有味于此而少知自反乎。”

0136 干饴糟 gān xíng zāo (《纲目》)

【异名】 干糖糟(《摘玄方》)

【基原】 为制饴糖后所余之渣滓，经晒干而成。

【成分】 全草含生物碱：亨脱灵碱(henderine)，紫堇醇灵碱(corynoline)，普托品(protopine)，别隐品碱(β -allocryptopine)^[1]。

【药性】 《纲目》：“甘，温，无毒。”

【功用主治】 《纲目》：“治反胃吐食，暖脾胃，化饮食，益气缓中。”

【选方】 治反胃呕吐不止，利胸膈，养脾胃，进饮食 干饴糟六两，生姜四两。二味同捣作饼，或焙或晒，入炙甘草(末)二两，盐少许，点汤服之。(《澹寮方》甘露汤)

【各家论述】 《纲目》：“饴以蘖成，暖而消导，故其糟能化滞缓中，养脾止吐也。”

0137 干岩研 gān yán qiān (南川《常用中草药手册》)

【异名】 岩黄连、毛紫堇、毛黄连、遍山白(《湖北中草药志》)，干岩堇(《新华本草纲要》)。

【基原】 为罂粟科紫堇属植物毛黄堇的全草。

【原植物】 毛黄堇 *Corydalis tomentella* Franch.

多年生草本，全体密被白色毛茸。主根肉质，圆锥形，灰黄色。茎1~3，直立或倾斜。叶基生，具长柄；叶片轮廓狭三角形，二回羽状复叶，一回裂片11~13枚，具短柄；二回裂片9~11枚；末回裂片宽倒卵形，先端钝圆或再2~3深裂。总状花序顶生，疏生花10余朵；苞片短小，卵状披针形；花冠金黄色，无毛，外轮上瓣先端具浅凹，距圆筒形，长约占全瓣长的2/3，末端略下弯。蒴果条形，全体被毛，

花柱宿存。花期夏季。

生于海拔600~1200m的悬崖陡壁少见雨水处。分布于湖北、四川。

【采收加工】 5~8月采集，晒干。

【药性】 苦，凉。

1. 《湖北中草药志》：“苦，凉。”

2. 《四川中药志》1982年版：“辛、苦，凉。”

【功用主治】 清热解毒，凉血止血，活血止痛。主治流行性感冒，咽喉肿痛，目赤疼痛，咳血，吐血，胃热脘痛，湿热泻痢，痈肿疮毒，跌打肿痛。

1. 《湖北中草药志》：“清热解毒，止泻。用于急性结膜炎，咽喉肿痛，牙龈肿痛，腹泻，外伤，疮毒等症。”

2. 《四川中药志》1982年版：“活血止痛，凉血止血，止咳。用于跌仆损伤，瘀肿疼痛，胃痛，血热妄行，吐血，咯血，湿热泻痢，肺热咳嗽。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~9g；或泡茶饮；研末，1.5g，每日3次。

【附方】 1. 治咽喉肿痛，牙龈肿痛 岩黄连3~6g。泡水当茶饮。(《湖北中草药志》)

2. 治火热亢盛，吐血，咯血 毛黄堇9g，黄芩9g，蒲黄(炒)9g，丹皮6g。水煎服。

3. 治胃热疼痛，湿热泄痢，肝郁胁痛 毛黄堇4.5g。研细末。每次服1.5g，每日3次。

4. 治跌打损伤，瘀肿疼痛 毛黄堇6g，红牛膝9g，川芎9g，白芷9g。浸酒服。(2~4方出自《四川中药志》1982年版)

0138 干檀香 gān tán xiāng (《昆明民间常用草药》)

【异名】 小青皮、小青香、小仙人掌、香疙瘩(《昆明民间常用草药》)，干香树、山苏木(《云南思茅中草药选》)，土檀香(《广西药用植物名录》)。

【基原】 为檀香科沙针属植物沙针或其变种豆瓣香树的全株。

【原植物】 1. 沙针 *Oxyris wightiana* Wall. ex Wight

灌木或小乔木，高2~5m。枝细长，嫩时呈三棱形。叶片薄革质，灰绿色，椭圆状披针形或椭圆状倒卵形，长2.5~6cm，宽0.6~2cm，先端尖，有短尖头，基部渐狭，下延而成短柄。花小；雄花2~4朵集成小聚伞花序，裂片3，花盘肉质，弯缺，雄蕊3，不育子房呈微小的突起；雌花单生，偶4或3朵聚生，苞片2枚，花梗顶部膨大，花盘、雄蕊如同雄花，但雄蕊不育；两性花外形



毛黄堇



沙针