

4. 《纲目》：“泻心汤治心气不足吐血、衄血者，乃真心之气不足，而手厥阴心包络、足厥阴肝、足太阴脾、足阳明胃之邪火有余也，虽曰泻心，实泻四经血中之伏火也。又仲景治心下痞满，按之软者，用大黄黄连泻心汤主之，此亦泻脾胃之湿热，非泻心也。病发于阴而反下之，则作痞满，乃寒伤营血，邪气乘虚结于上焦，胃之上脘在于心，故曰泻心，实泻脾也。《素问》云：‘太阴所至为痞满’。又云：‘浊气在上，则生腹胀’是矣。病发于阳而反下之，则成结胸，乃热邪陷入血分，亦在上脘分野，仲景陷胸汤、丸皆用大黄，亦泻脾胃血分之邪而降其浊气也。若结胸在气分，则只用小陷胸汤，痞满在气分，则用半夏泻心汤矣。成无己《注解伤寒论》亦不知分别此义。”

5. 《雷公炮制药性解》：“按大黄之入脾胃大肠，人所解也，其入心与肝也，人多不究。昔仲景百劳丸、蜜虫丸，都用大黄以理劳伤吐衄，意最深微。盖以浊阴不降则清阳不升者，天地之道也；瘀血不去则新血不生者，人身之道也。蒸热日久，瘀血停于经络，必得大黄以豁之，则肝脾通畅，陈推而新致矣。今之治劳，多用滋阴，频服不效，坐而待毙，嗟乎！术岂止此耶？至痲肿、目疾及痢疾，咸热瘀所致，故并治之。”

6. 《本草正》：“大黄，欲速者生用，泡汤便吞；欲缓者熟用，和药煎服。”

7. 《本草崇原》：“西北之人，土气敦厚，阳气伏藏，重用大黄，能养阴而不破泄；东南之人，土气虚浮，阳气外泄，稍用大黄，即伤脾胃。此五方五土之有不同也。又总察四方之人，凡禀气厚实，积热留中，大黄能养阴而推陈致新，用之可也；若素禀虚寒，虽据证当用大黄，亦宜其人而酌减，此因质禀之有不同也。”

8. 《血证论》：“（大黄）能推陈致新以损阳和阴，非徒下胃中之气也。即外而经脉肌肤躯壳，凡属气逆于血分之中，致有血不和处，大黄之性亦无不达。盖其药气最盛，故能克而制之，使气之逆者，不敢不顺，既速下降之势，又无遗留之邪。”

9. 《衷中参西录》：“大黄味苦气香性凉，能入血分破一切瘀血。为其气香，故兼入气分，少用之亦能调气，治气郁作疼。其力沉而不浮，以攻决为用，下一切癥瘕积聚，能开心下热痰以愈疯狂，降肠胃热实以通燥结，其香窜透窍之力，又兼利小便。性虽趋下，而又善清在上之热，故目疼齿疼，用之皆为要药。又善解疮疡热毒，以治疗毒，尤为特效之药（疗毒甚剧，他药不效者，当重用大黄以通其大便自愈）。其性能降胃热，并能引胃气下行，故善止吐衄。仲景治吐血、衄血有泻心汤，大黄与黄连、黄芩并用。”

10. 《本草正义》：“大黄，迅速善走，直达下焦，深入血分，无坚不破，荡涤积垢，有犁庭扫穴，攘除奸凶之功。”“《金匱》泻心汤治吐血、衄血，明是阳亢上逆，迫血妄行，故以大黄、芩、连直折其炎上之势，而乃云心气不足，必是传写有误。”“（大黄）生用者其力全，迅如走丸，一过不留，除邪而不伤正气；制过者其力已缓，颇难速效。东垣谓治在上者，非酒不至，必用酒浸，引上至高之分，驱热而下，未免矫揉造作，用违其长。但久制者，可从小便以导湿热，惟清宁丸能有此功，而寻常之酒制军，非其伦比。近人亦有谓生者走后阴，熟者走前阴，殊不确也。”

0182 **大戟** dà jǐ
（《本经》）

【异名】 邛钜（《尔雅》），红芽大戟（《小儿药证直诀》），紫大戟（《三因方》），下马仙（《纲目》），京大戟（《江苏南部种子

植物手册》），乳浆草（《植物名实图考》），龙虎草、九头狮子草、将军草、膨胀草、黄花大戟、黄芽大戟、千层塔、搜山虎、穿山虎（《中药大辞典》）。

【基原】 为大戟科大戟属植物大戟的根。

【原植物】 大戟 *Euphorbia peginensis* Rupr.

多年生草本，高 30~90 cm。全株含白色乳汁。根粗壮，圆锥形，有侧根。茎自上部分枝，表面被白色短柔毛。单叶互生；几无柄；叶片狭长圆状披针形，长 3~8 cm，宽 6~12 mm，先端钝或尖，基部渐狭，全缘，具明显中脉，上面无毛，下面在中脉上有毛。杯状聚伞花序顶生或腋生，顶生者通常 5 枝，排列成复伞形；基部有叶状苞片 5；每枝再作二至数回分枝，分枝处着生近圆形的苞叶 4 或 2，对生；腋生者伞梗单生；苞叶卵状长圆形，先端尖；杯状聚伞花序的总苞钟形或陀螺形，4~5 裂，腺体 4~5，长圆形，肉质肥厚，内面基部有毛，两腺体之间有膜质长圆形附属物；雌雄花均无花被；雄花多数，花丝基部较花梗稍粗壮，两者之间有关节，花药球形，横裂；雌花 1；花柱先端 2 裂。蒴果三棱状球形，密被刺疣。种子卵形，光滑。花期 6~9 月，果期 7~10 月。

生于山坡、路旁、荒地、草丛、林缘及疏林下。全国除广东、海南、广西、云南、西藏、新疆外各地均有分布。

【栽培】 生物学特性 喜温暖湿润气候，耐旱，耐寒，喜潮湿。对土壤要求不严，以土层深厚、疏松肥沃、排水良好的砂质壤土或黏质壤土栽培为好。

繁殖方法 种子繁殖或分根繁殖。种子繁殖：4 月上旬育苗，撒播或条播，将种子均匀播下，覆薄细土，稍加镇压，浇水，保持床土湿润。经 2~3 星期出苗。苗高 12~15 cm 时移栽。选阴天，将床地浇透水，挖出幼苗，按行株距 30 cm×25 cm 开穴，穴深 12 cm，每穴栽种 1 株，覆土压实，浇水。分根繁殖：秋季枯叶后或早春萌芽前，挖掘根部，进行分根，每根带有 2~3 个芽，按行株距 30 cm×25 cm 开穴栽种。


田间管理 幼苗定植后，如有缺株，应及时补栽，并施 1 次稀人粪尿。现蕾时要及时摘蕾，再施 1 次粪肥或饼肥。每隔半月需松土除草。

【采收加工】 8~10 月地上部分枯萎后至早春萌芽前，挖掘地下根，切段或切片，晒干或烘干。

【药材】 大戟 *Radix Euphorbiae Peginensis* 主产于江苏等地。

性状 根呈不规则长圆锥形，略弯曲，常有分枝，根头膨大，残留茎基及芽痕。表面灰棕色或棕褐色，粗糙，具纵直沟纹及横向皮孔，支根少而扭曲。质坚硬，断面类棕黄色或类白色，纤维性。气微，味微苦、涩。

鉴别 (1) 根横切面：木栓层为十数列木栓细胞。皮层狭窄。韧皮部散有



大戟



大戟(根)外形