

(2) 取本品粉末 2 g, 加乙醇 40 ml, 置水浴上回流 2 h, 放冷, 滤过。取滤液 2 ml, 置水浴上蒸干, 残渣加 1% 盐酸溶液 4 ml 溶解, 滤过。滤液加碘化铋钾试液 1~2 滴, 产生棕色沉淀; 加碘化钾碘试液 1~2 滴, 产生棕红色沉淀; 加碘化汞钾试液 1~2 滴, 产生灰棕色沉淀(检查生物碱)。

【成分】 全株含娃儿藤定碱(tylophorinidine)和娃儿藤宁碱(tylophorinine)^[1]。

【药性】 《广西中药志》:“味辛, 性温, 有小毒。入肺经。”

【功用主治】 祛风湿, 化痰止咳, 散瘀止痛, 解蛇毒。主治风湿痹痛, 咳喘痰多, 跌打肿痛, 毒蛇咬伤。

1. 《广西中药志》:“祛风, 止咳化痰, 散瘀, 催吐。治气喘痰咳, 跌打刀伤, 风湿痛。”

2. 《全国中草药汇编》:“祛风除湿, 散瘀止痛, 止咳定喘, 解蛇毒。”

【用法用量】 内服: 煎汤, 3~9 g; 或研末。外用: 鲜品捣敷。

【宜忌】 孕妇及体虚者禁服。本品有毒, 服用过量易致中毒, 表现为头晕眼花、呕吐、四肢无力、麻木, 严重者呼吸困难、心跳由强变弱, 最后因心跳停止而死亡。

【选方】 1. 治风湿腰痛 (藤细辛) 根 6~9 g, 牛尾菜 3 g, 水煎服。《湖南药物志》

2. 治哮喘顽痰 三十六荡 15 g, 煎水服。痰吐出后, 用大蓟 12 g, 金不换 15~24 g, 小罗伞 9 g, 煲猪肉食。《广西中药志》

3. 治竹叶青蛇、眼镜蛇咬伤 (藤细辛) 鲜根捣烂, 加酒适量调匀, 由上而下涂擦伤口周围。《湖南药物志》

0119 三爪金龙 sān zhǎo jīn lóng 《全国中草药汇编》

【异名】 小红藤、绿葡萄藤(《贵州民间药物》), 喜马拉雅爬山虎(《贵州草药》), 三爪风、大血藤(《贵州中草药名录》)。

【基原】 为葡萄科爬山虎属植物三叶爬山虎的全株。

【原植物】 三叶爬山虎 *Parthenocissus himalayana* (Royle) Planch. [*Ampelopsis himalayana* Royle]

落叶木质藤本。多分枝, 枝粗壮, 土褐色; 卷须短而分枝, 顶端有吸盘。掌状 3 小叶互生; 总叶柄长 5~12 cm; 叶片纸质, 中间小叶卵形或宽披针状卵形, 长 6~12 cm, 宽 2~7 cm, 先端渐尖或近尾状, 基部楔形, 侧生小叶不对称, 斜卵形, 边缘有明显而带尖头的锯齿, 上面无毛, 下面或沿叶脉有疏柔毛; 小叶柄长 5~6 mm。花两性, 聚伞花序常生于短枝的顶端或与叶对生; 花梗较叶柄短; 花淡绿色, 5 数, 有时 4 数; 花萼浅碟状, 全缘; 花瓣长圆形; 雄蕊与花瓣对生; 花盘不明显; 花柱短圆柱形, 花瓣脱落后先端常扩大成盘状。浆果球形, 熟时变黑褐色, 具白粉。种子 1~2 颗。

常攀附于墙壁或树干上。分布于中南、西南及西藏、甘肃等地。

【采收加工】 6~9 月采叶, 鲜用或晒干。9~11 月采收



三叶爬山虎

根及茎, 切片或切段, 鲜用或晒干。

【药性】 辛, 温。

1. 《贵州民间药物》:“性温, 味辛。”

2. 《全国中草药汇编》:“辛、甘、平。”

【功用主治】 祛风除湿, 化瘀通络。主治风湿痹痛, 跌打损伤, 骨折。

1. 《贵州民间药物》:“接骨。治跌打损伤, 骨折, 风湿。”

2. 《贵州草药》:“接骨化瘀, 祛风除湿。”

【用法用量】 内服: 煎汤, 10~15 g; 或浸酒。外用: 煎水洗; 或捣烂敷。

【选方】 1. 治风湿 小红藤、三角风等分。煎水洗患处。

2. 治跌打损伤 小红藤、见血飞各 30 g。泡酒服。

3. 治骨折 小红藤、赤葛根各等分。捣烂, 加酒炒热包患处。(1~3 方出自《贵州民间药物》)

0120 三白草根 sān bái cǎo gēn 《本草经集注》

【异名】 三白根(《补缺肘后方》), 塘边藕(《生草药性备要》), 地藕(《眼科要览》), 百节藕(《植物名实图考长编》), 过塘藕、水莲藕(《广西中兽医药用植物》), 白莲藕(《广西中药志》), 九节藕(《江西民间草药验方》)。

【基原】 为三白草科三白草属植物三白草 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. 的根茎。

【原植物】 参见“三白草”条。

【采收加工】 9~10 月采挖, 鲜用或晒干。

【药材】 三白草根 *Rhizoma Saururi* 产于江苏、浙江、湖南、广东等地。

性状 本品根茎圆柱形, 稍弯曲, 有分枝, 长短不等; 表面灰褐色, 粗糙, 有节和纵皱, 节上有须根, 呈环节状, 节间长约 2 cm; 质硬而脆, 易折断, 断面类白色, 粉性。

鉴别 (1) 根茎横切面: 表皮细胞类方形, 有的含黄色物。皮层约占半径的 1/3, 薄壁细胞类圆形, 作圈链状排列; 有油细胞和分泌管散在; 内皮层明显。外韧维管束 20~30 个, 排列成环。髓部薄壁细胞亦成圈链状排列, 胞间隙大; 有油细胞和分泌管分布。

(2) 参见“三白草”条。

【成分】 根含木脂素类: saucerneol A、B、C, di-O-methyltetrahydrofuriguaiacin B, 红楠树脂素(machilin) D 及其 4-甲酯(machilin D 4-mether)^[1], 三白草素(saururin) A^[2]。另含二萜: 三白草呋喃(saurufuran) A、B^[3]。

【药理】 对糖尿病的治疗作用 单次和连续服用三白草糖对糖尿病小鼠动物模型有明显降血糖作用, 超氧化物歧化酶升高, 丙二醛降低, 说明三白草对预防和治疗糖尿病均起积极作用^[1]。

【药性】 甘、辛, 寒。

1. 《本草蒙筌》:“味甘、辛, 气寒。”

2. 《分类草药性》:“味苦, 性热。”

【功用主治】 利尿除湿, 清热解毒。主治脚气, 水肿, 淋浊, 带下, 痈肿, 疔疮疥癣, 风湿热痹。

1. 《本草经集注》:“疗脚下气, 亦甚有验。”

2. 《本草蒙筌》:“用惟取根, 利大小便, 逐脚膝气, 除痞满去疔, 破坚癖驱痰, 疔肿仍消, 积聚尤却。”

3. 《纲目》:“疗脚气, 风毒胫肿, 捣酒服, 亦甚有验。又煎汤, 洗癣疮。”

4. 《生草药性备要》:“治淋浊, 利小便, 清热毒。拔腐肉骨, 与陈梅同敷。”