

0001 一支箭 yī zhī jiàn 《草木便方》

【异名】青藤(《分类草药性》),蛇咬子(《四川中药志》)。

【基原】为瓶尔小草科瓶尔小草属植物尖头瓶尔小草等的带根全草。

【原植物】尖头瓶尔小草 *Ophioglossum pedunculosum* Desv. 又名:有梗瓶尔小草(《中国主要植物图说》)。

多年生小草本,植株高15~25 cm。根茎短而直立,根肉质簇生。叶单一,总柄纤细,长10~20 cm;营养叶自总柄下部6~10 cm处生出,叶片革质,卵圆形,长3~6 cm,宽2~2.8 cm,近基部最宽,近圆楔形,略下延,全缘,先端圆钝或有小突尖,叶脉网状。孢子叶自营养叶基部抽出,有8~16 cm长的柄,高出营养叶。孢子囊穗条形,长3~4 cm,先端有突尖。

生于海拔1000 m左右的开阔山坡灌丛中。分布于安徽、江西、福建、广东、四川、贵州、云南、台湾等地。

此外,同属植物钝头瓶尔小草 *O. petiolatum* Hook.,分布于西南及陕西、台湾等地;狭叶瓶尔小草 *O. thermale* Kom.,分布于东北及河北、江苏、江西、四川、云南、陕西等地;心脏叶瓶尔小草 *O. reticulatum* L.,分布于西南及福建、江西、河南、湖北、广西、陕西、甘肃、台湾等地。以上植物的带根全草亦可作“一支箭”入药。

【采收加工】5~7月采挖带根全草,晒干或鲜用。


【药材】一支箭 *Herba Ophioglossi* 产于福建、台湾、广东、安徽、江西、贵州、云南等地。

性状 全体蜷缩状。根茎短。根细小,圆柱形,弯曲,黄棕色。叶2~3枚,总叶柄长10~20 cm;营养叶展开后呈卵圆形,长3~6 cm,宽2~2.5 cm;先端钝或稍急尖,基部圆楔形或阔楔形,柄长5~10 mm,两侧有狭翅,革质,表面绿黄色,叶脉网状。孢子囊穗条形,长2.5~3.5 cm,先端尖,从总柄顶端生出,有8~15 cm长的柄。质柔软,难折断。气微,味淡。

【成分】同属植物钝头瓶尔小草根含半胱氨酸和鸟氨酸等^[1]。

地上部分含丙氨酸,精氨酸,二氨基丁酸,谷氨酸,赖氨酸,丝氨酸,苏氨酸^[2]。

狭叶瓶尔小草含二酯酰甘油基三甲基高丝氨酸(diacylg-



尖头瓶尔小草

画

lyceryltrimethylhomoserine)^[3]。

【药性】苦、甘,微寒。归肝经。

1.《草木便方》:“苦,入厥阴。”

2.《分类草药性》:“味甘、平,无毒。”

3.《陕西中草药》:“味甘、辛,性凉,有小毒。”

【功用主治】清热解毒,活血祛瘀。主治痈肿疮毒,疥疮,痔疮,毒蛇咬伤,烧烫伤,跌打损伤,小儿疳积。

1.《草木便方》:“清热毒,除风热。治肾囊肿痛,疔肿恶毒,胸腹宿血,蛇毒。”

2.《分类草药性》:“治痒子,消诸疮毒,跌打损伤,肿毒。”

3.《四川中药志》1979年版:“清热解毒,活血通瘀。用于湿热毒疮,疥疮,跌打损伤,烧烫伤,痔疮等。”

【用法用量】内服:煎汤,15~30 g。外用:鲜品捣敷;或煎水洗;或研末调敷。

【选方】1.治疗肿、疔疮 一支箭、五爪龙各适量。共捣烂外敷。(《恩施中草药手册》)

2.治乳痈 一支箭、蒲公英各适量,共捣烂外敷。(《陕西中草药》)

3.治跌打损伤,血瘀肿痛 一支箭60 g,峨参60 g,大血藤60 g,红牛膝60 g,泡酒。每服15 g。(《四川中药志》1979年版)

4.治小儿疳积 一支箭15 g,使君子9 g,鸡内金9 g。水煎服。(《中国药用孢子植物》)


0002 一匹草 yī pǐ cǎo 《民间常用草药汇编》

【异名】一匹叶(《民间常用草药汇编》)。

【基原】为兰科卷瓣兰属植物梳帽卷瓣兰的全草。

【原植物】梳帽卷瓣兰 *Cirrhopetalum andersonii* Hook. f. [*C. henryi* Rolfe] 又名:卷瓣兰(《中药大辞典》),橙红卷瓣兰(《广西药用植物名录》)。

附生植物。根茎粗4~5 mm。假鳞茎宽卵形或狭卵形,长约3 cm,须根发达。顶生1叶,具短柄;叶片革质,长圆形,长13~20 cm,宽约3.5 cm,先端微凹,全缘。花茎纤细,被2~3枚鞘状苞片;伞形花序具多数花;花淡紫色;中萼片长圆状卵圆形,长约5 mm,先端具芒,边缘近先端多少啮蚀状;侧萼片比中萼片长3~4倍,内侧边缘除基部和先端外粘合,先端钝;花瓣长圆形,比中萼片稍短,先端具芒,边缘具流苏;唇瓣肉质,中部弯曲,全缘,生于蕊柱足上;蕊柱齿短;花药前面边缘梳状。



梳帽卷瓣兰