

7. 《本草汇》：“治胸痹、阴痛，暖阴户。”
8. 《医林纂要》：“补肝、润命门，暖胃、去中寒，泻肺、散风湿。”
9. 《本草再新》：“开九窍，舒郁气，去风，行水。”

【用法用量】 内服：煎汤，2~5 g；或入丸、散。外用：研末撒或调敷。

【宜忌】 阳热诸证及阴虚内热者禁服。

1. 《雷公炮炙论》：“不可见火。畏郁金。”
2. 《纲目》引张洁古：“气血盛者勿服。”
3. 《本草经疏》：“一切有火热诸证忌之，非属虚寒，概勿施用。”
4. 《本草用法研究》：“扁桃腺炎、胃出血、脑充血均忌。”

【选方】 1. 治胃寒呃逆，脉迟者 丁香、柿蒂、人参、生姜，水煎服。（《症因脉治》丁香柿蒂汤）

2. 治脾中虚寒，停痰留饮，哕逆呕吐 丁香、半夏各三钱，加生姜，水煎，温服。（《医学入门》丁夏汤）

3. 治冷心疼，面青唇黑，手足厥冷 丁香、良姜、官桂各一钱五分，水一碗，煎七分，用胡椒五十粒，炒黄色为末，调入汤药内顿服。（《古今医鉴》丁胡三建汤）

4. 治水泻不止 枯矾一钱，丁香五分，上为末，黄酒调服。（《仙拈集》丁矾散）

5. 治偏头痛 丁香一粒（大者，研），棘针四十九枚（倒钩者，烧灰存性，为末），麝香一皂子大（研），上为末。以纸拈药，随痛左右搐鼻。（《圣济总录》丁香散）

6. 治头痛，及无形寒湿，附骨流注 丁香三钱，肉桂一两，上为末，加入伤膏内用之。（《外科传薪集》丁桂散）

7. 牙根肿痛 丁香、川椒（取红）等分，冰片少许。上为末，敷痛处。（《景岳全书》三香散）

8. 治瘰疬 丁香五十个，斑蝥十个，麝香一钱（别研）。上为细末，用盐豉五十粒，汤浸，研如泥，和前药令匀，丸如绿豆大。每服五七丸，食前温酒送下，一日三次。（《济生方》三圣丸）

9. 治乳头破裂，疼痛 丁香不拘多少为末，干敷裂处，如燥，津唾调敷。（《医学正传》引朱丹溪方丁香散）

【临床报道】 1. 治疗呃逆 公丁香 1 g 左右（10~15 粒），细嚼（嚼时有大量唾液分泌，切勿将其吐出），徐徐咽下，待药味尽，将口内剩余药渣吞下。30 min 如不止，可续用 3 次。共治呃逆患者 238 例，全部有效。立效者 230 例，30 min 以上呃止者 8 例^[1]。

2. 治疗妊娠呕吐 用半夏 15 g，丁香 15 g，共为细末，生姜 30 g，捣碎煎汁，入前末调成糊状，置于容器中备用。用时先将患者脐部皮肤洗净，再将药末敷于脐部，厚约 1 cm，直径 10 cm 左右，用塑料薄膜覆盖，绷带或胶布固定。每日换药 1 次。共治疗 33 例。结果：用药 1~3 d 治愈者 32 例，无效 1 例。脐部皮肤出现烧灼感，并出现水泡或皮疹者，应立即停药^[2]。

3. 治疗疟疾 丁香研末，每次用 1.2~1.5 g。将丁香末放入患者肚脐窝内用胶布盖贴，时间 3~5 d。注意用药时先将脐窝污垢擦洗干净；胶布不宜太小，贴时必须用手轻轻按摩数分钟；用药必须在未发作前 4~6 h。共治疗疟疾患者 100 例，结果 94 例治愈^[3]。

4. 治疗麻痹性肠梗阻 丁香 30~60 g，研成细末，加 75% 乙醇调和（对乙醇过敏者，可用开水调和），敷于脐及脐周，直径 6~8 cm，上用纱布、塑料药膜覆盖，再以胶布固定（对胶布过敏者，改用绷带固定）。用上法治疗 20 例，其中

腹痛手术后肠麻痹 10 例，弥漫性腹膜炎后肠麻痹 7 例，脊椎损伤所致肠麻痹 3 例，结果全部有效，其中用药 1 次者 15 例，用药 3 次者 15 例。用药 2 h 后可听到肠鸣音，4~8 h 排便、排气。机械性肠梗阻不适宜应用本法^[4]。

5. 治疗小儿腹泻 用丁香 1.5 g，肉桂 3 g，共研细末备用。使用时取药粉少许用水调成糊状，摊在 3 cm×3 cm 的伤湿止痛膏上，然后稍加热，将膏药贴于脐上，每 12 h 换药 1 次。敷药期间口服补液。共治疗 120 例，结果：敷药 1 次治愈 80 例，敷药 2 次治愈 35 例，敷药 3 次治愈 4 例，无效 1 例，总有效率 99%。未发现不良反应，少数患儿脐周皮肤充血，考虑为伤湿止痛膏刺激所致，取下后充血即自行消失^[5]。

【各家论述】 1. 《宝庆本草折衷》：“丁香，惟胃脘寒积凝滞，食之即呕，服之无不中。倘或热呕，此性既热，必致膈截上焦，反为僭燥，尤须审寒热之宜。”

2. 《本草通玄》：“丁香，温中健胃，须于丸剂中同润药用乃佳。独用多用，易于僭上，损肺伤目。”

3. 《本草求真》：“丁香，辛温纯阳，细嚼力直下达，故书载能泄肺、温胃、暖肾。非若缩砂蜜，功专温肺和中，木香功专温脾行滞，沉香功专入肾补火，而于他脏则止兼而及之也。是以亡阳诸症，一切呕哕呃逆反胃，并霍乱呕哕，心腹冷疼，并痘疮灰白，服此逐步开关，直入丹田，而使寒去阳复，胃开气缩不致上达而为病矣。此为暖胃补命要剂，故逆得温而逐，而呃自可以止。若止用此逐滞，则木香较此更利。”

4. 《药论》：“（丁香）攻胃口之寒痰而呕吐除；祛心下之冷痛而呃逆宁。噫膈翻胃，赖为却剂；奔豚疝气，藉兹引经。”

0023 丁公藤 dīng gōng téng (广州空军《常用中草药手册》)

【异名】 包公藤。

【基原】 为旋花科丁公藤属植物丁公藤及光叶丁公藤的藤茎。

【原植物】 1. 丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 又名：麻辣子（《海南植物志》）。

木质藤本，长约 12 m。小枝干后黄褐色，明显有棱。单叶互生；叶柄长 0.8~1.2 cm；叶片革质，椭圆形或倒长卵形，长 6.5~9 cm，宽 2.5~4 cm，先端钝或钝圆，基部渐狭成楔形。聚伞花序腋生和顶生，花序轴和花梗被淡褐色柔毛；花萼球形，萼片 5，近圆形，外面被淡褐色柔毛并有缘毛；花冠白色，5 裂，裂片长圆形，全缘或浅波状；子房圆柱形，柱头圆锥状，贴着子房。浆果卵状椭圆形。种子 1 颗。花期 6~8 月。

生于山谷湿润密林中或路旁灌丛中。分布于广东、海南等地。

2. 光叶丁公藤 *E. schmidii* Craib

植物形态与丁公藤相似，区别点是：叶片卵状椭圆形至长圆状椭圆形，先端骤然渐尖；花冠裂片边缘啮蚀状；浆果球形。



丁公藤