


又名:野地瓜藤(贵州)。

多年生缠绕草本,长达1m左右。块根大,球形、卵圆形、椭圆形不等,单个或2~3个成串,表皮红褐色、暗褐色或肉白色,有乳状黏液。茎细长,圆柱形,有细棱,大多旋扭。单叶互生;叶柄长0.8~3.5cm,被短柔毛;叶片椭圆形、卵形或长圆形,长2.5~11.5cm,宽1.5~5cm,先端钝,微凹,具小短尖头,基部钝圆或楔形或微呈心形,边缘微啮蚀状或近全缘,两面无毛,仅叶片基部被少数缘毛。花单生叶腋或成简单的聚伞花序,着生2~3朵或数朵花,花序梗长2~6cm;苞片2枚,鳞片状;萼片5;花冠淡黄色,漏斗形,瓣中带先端被淡黄色短柔毛;雄蕊5,花丝基部扩大,被毛;花盘环状;子房圆锥状,2室,无毛,柱头二球形。蒴果长圆形,4瓣裂。种子1~4颗。花期夏、秋季。



山土瓜

生于海拔1200~3200m的山区草坡地、灌木丛中或松林下。分布于四川、贵州、云南等地。

【采收加工】 9~10月采挖块根,切片,鲜用或晒干。

【药材】 土瓜 *Radix Merremiae Hungaiensis* 产于四川、贵州、云南等地。

性状 块根球形或卵圆形,或切成块片。表面红棕色或黄白色,粗糙。块片近圆形,厚约5mm,切面黄白色,有干缩皱纹,周围皮部菲薄。质较疏松,粉性。气微,味微甜。

【成分】 根含树脂糖苷:土瓜球根牵牛苷(tuguajalopin) I~X<sup>[1]</sup>;土瓜球根牵牛苷X的二聚体:鱼黄草精(merremmin)<sup>[2]</sup>。

【药性】 《滇南本草》:“甘,平。”“红土瓜入脾、胃二经。白者入肺经。”

【功用主治】 清热,除湿,止咳,健脾。主治黄疸,肺热咳嗽,便血,乳少,带下,小儿疳积,水火烫伤。

1. 《滇南本草》:“有红白两种。红者治妇人赤白带下,通经解热;治咳嗽,肺经结热成痈,亦治妇人乳结不通,阴阳不分,子宫虚冷,男子精寒;又健脾胃而生津液,生食止呕疗饥;补脾,解胃热,宽中,利小便,止大肠下血。白者治肺热,消渴,利小便;治肺痈咳嗽,通乳汁。”

2. 《云南中草药》:“健脾利湿,养阴柔肝。主治小儿疳积,疝气,慢性肝炎。”

【用法用量】 内服:煎汤,12~15g;或生啖。外用:捣敷。

【选方】 治慢性肝炎 红土瓜30g,红糖或蜂蜜为引,水煎服。《云南中草药》


### 0143 土附 tǔ fù 《纲目拾遗》

【异名】 土部、鲈鳢、荡部、荡鱼《演繁露》,土步《玉食批》,吐哺《三才藻异》,菜花鱼《嘉兴县志》,鲋鱼《湖州府志》,土鳘、土哺《钱塘县志》,土鲋《随息居饮食谱》。

【基原】 为塘鳢科沙塘鳢属动物沙塘鳢的肉。

【原动物】 沙塘鳢 *Odontobutis obscura* (Temminck et Schlegel) 又名:塘鳢鱼《中药大辞典》,沙鲤《中国经济动物志·淡水鱼类》。

体粗壮,前部呈圆筒形,后部侧扁。体长约18cm。头部大,稍扁平,较躯体为阔。口上位,口裂宽方,下颌长于上颌。鳃耙上有小刺。眼小,上位,眼间隔凹入。体侧和背部被栉鳞;腹部为圆鳞,侧线鳞33~37。生殖乳突明显,雌者较宽大,末端分叉,雄者三角形,末端尖细。背鳍2个。第一背鳍VII~VIII,第二背鳍I,8~9。臀鳍I,7。胸鳍大,腹鳍胸位,尾鳍圆形。背部黑褐色,体侧有黑色斑纹,腹部淡黄色,无黑色斑点。



沙塘鳢

多生活于河沟及湖泊中,喜栖息于泥沙、杂草和碎石较多且相混杂的岸边浅水中,游泳力不强。产卵期4~6月。分布于江苏、浙江、安徽、福建等地。

本动物的卵子(土附子)亦供药用,另设专条。

【采收加工】 全年均可捕捉,取肉,鲜用。

【药性】 姚可成《食物本草》:“味甘,温,无毒。”

【功用主治】 补脾益气,除湿利水。主治脾虚食少,水肿,湿疮,疥癣。

1. 姚可成《食物本草》:“补脾胃,益元气,养荣血。”

2. 《纲目拾遗》:“补脾胃,治噎膈,除水肿湿气,疗一切疮疥,又能扶阳。”

【用法用量】 内服:炖食,适量。

### 0144 土蜂 tǔ fēng 《本经》

【异名】 蜚零《本经》,马蜂、螳《尔雅》郭璞注。

【基原】 为土蜂科土蜂属动物赤纹土蜂和胡蜂科黄胡蜂属动物环黄胡蜂的全虫。

【原动物】 1. 赤纹土蜂 *Scolia vittifrons* Sau.

体长15~24mm,黑色。头棕色,单眼3个,复眼肾形,唇基黑色,大颚发达,黑色,有3个黑色的齿,触角深褐色。中胸背板黑色,后小盾片三角形,足部股节黑色,胫节铁锈色,翅褐色,腹部第一至第六节后缘红棕色,腹部具两个黄色斑点。



赤纹土蜂

在土中筑多层巢。分布于东北及河北、山西、江西、山东、河南、广东、甘肃等地。

2. 环黄胡蜂 *Vespula koreensis orbata* Buysson

体较大,长约17mm。头略呈卵圆形,复眼2个,单眼呈倒三角形,排列于两复眼顶部之间,触角1对。前胸背板黑色,但沿中胸背板处为黄色,光滑。中胸背板黑色。翅基片棕色,翅呈棕色。腹部第三至第六节背板全呈棕色,第三至第五节两侧隐有暗斑。

单栖性,筑巢于地穴中。分布于四川等地。

【采收加工】 夏、秋季捕捉,捕得后用沸水烫死,晒干。

【药材】 土蜂 *Scolia vittifrons* 产于东北、华北、华中各地,以东北产量大。