

化碳致肝损伤小鼠和大鼠血清丙氨酸氨基转移酶,降低 D-氨基半乳糖致肝损伤小鼠血清丙氨酸氨基转移酶,说明一枝蒿提取物具有明显的保护化学性肝损伤及治疗免疫性肝炎的功能,但对免疫性肝炎无预防作用^[5]。

毒性 小鼠腹腔注射一枝蒿水煎醇沉液, LD₅₀ 为 23.91 g/kg^[1]。

【药性】 《新疆中草药》:“辛,微温。”

【功用主治】 祛风解表,健胃消积,活血解毒。主治风寒感冒,食积,跌打瘀肿,毒蛇咬伤,荨麻疹。

1. 《纲目拾遗》:“活血解毒,去一切积滞、沉痾阴寒等疾,祛风理气。”

2. 《新疆中草药》:“清热解毒,消食健胃,镇静镇吐。”

【用法用量】 内服:煎汤,10~15 g;或入丸剂。外用:熬膏或泡酒涂敷。

【选方】 1. 治感冒呕吐 一枝蒿 9 g,唇香草 1.5 g。水煎浓汁,加糖少许服。

2. 治饮食过度,消化不良,胃疼胃胀 一枝蒿 9 g,土木香 3 g。水煎成汁服。(1、2方出自《新疆中草药》)

3. 治黄疸肝炎 一枝蒿 9 g,琐琐葡萄 15 g,新塔花 6 g,水煎服。

4. 治跌打红肿 一枝蒿、当归、鹿蹄草各 9 g,唇香草 3 g,水煎服。另取一枝蒿、土当归等分,制成 20% 药酒外敷。

5. 治毒蛇咬伤、荨麻疹 一枝蒿 15~24 g,水煎当茶饮,同时煎汤洗患处。(3~5方出自《中国民族药志》)

6. 治神经性皮炎 新疆一支蒿熬膏涂患处。(《全国中草药汇编》)

0008 一枝旗 yī zhī qí (《广西药用植物名录》)

【异名】 东南星蕨(《中国药用孢子植物》),石韦(《广西药用植物名录》),灯火草(《新华本草纲要》)。

【基原】 为水龙骨科星蕨属植物攀缘星蕨的全草。

【原植物】 攀缘星蕨 *Microsorium buergerianum* (Miq.) Ching [*Polypodium buergerianum* Miq.] 又名:波氏星蕨(《中国蕨类植物图谱》)。

植株高 20~50 cm。根茎攀缘,略呈扁平状,疏被披针形鳞片,尖头,基部卵圆,边缘有疏齿。叶远生;叶柄长 3~7 cm,基部疏被鳞片,并以关节与根茎相连;叶片厚纸质,狭长披针形,长 10~43 cm,宽 2~4.5 cm,基部急缩狭为楔形而下延成翅,全缘或略呈波状;中脉两面隆起,侧脉不明显,小脉网状,网眼内有分叉的内藏小脉。孢子囊群圆形,小而密,散生于孢子叶背面的上半部;无囊群盖。

生于海拔 500~1500 m 的山地林缘,攀缘于树干或岩石上。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、台湾等地。

【采收加工】 全年均可采收,晒干。

【药性】 《中国药用孢子植物》:“微苦、涩、凉。”

【功用主治】 清热利湿。主治淋证,黄疸。

1. 《中国药用孢子植物》:“清热利湿。治尿路感染、



攀缘星蕨

黄疸等。”

2. 《中药通报》1983, (6):13:“清热解毒,散结消肿,治淋巴结炎。”

【用法用量】 内服:煎汤,10~15 g。

【选方】 1. 治尿路感染 东南星蕨 15 g,石韦 15 g,海金沙 9 g,水煎服。

2. 治黄疸 东南星蕨 15 g,茵陈 15 g,龙胆草 6 g,煎服。(1、2方出自《中国药用孢子植物》)

0009 一柱香 yī zhù xiāng (《贵州民间药物》)

【基原】 为茜草科假耳草属植物假耳草的全草。

【原植物】 假耳草 *Anotis ingrata* (Wall.) Hook. f. 又名:臭假耳草(《广西植物名录》)。

多年生草本,高 1 m。茎不分枝或有少数分枝,直立或下部卧地。叶对生,柄短,托叶下部近三角形,连合,着生于两叶柄之间,边缘具细绒毛;叶片薄纸质,卵圆形或长卵圆形至卵状披针形,长 4~9 cm,宽约 1.8 cm,先端渐尖,基部楔形,全缘,两面均被短柔毛。二歧聚伞花序顶生,总花梗和分枝均有狭翅状棱角;花白色,花萼 4 裂,裂片三角状披针形;花冠长约 5 mm,冠管稍宽,内生柔毛;雄蕊 4,花药露出花冠外;子房下位,2 室,柱头 2 裂。蒴果近球形。种子小而多数。花期 6~7 月,果期 7~8 月。



假耳草

生于山坡草地、林下荫湿处。分布于西南各地。

【采收加工】 7~10 月采收,鲜用或晒干备用。

【药性】 《贵州民间药物》:“性凉,味辛。”

【功用主治】 清热解毒。主治目赤红肿,无名肿毒,毒蛇咬伤。

1. 《贵州民间药物》:“清热散郁。治眼红肿。”

2. 《贵州草药》:“治无名肿毒。”

【用法用量】 外用:捣敷;或煎水熏洗。

【选方】 1. 治眼红肿 一柱香 30 g,煎水熏患眼。(《贵州民间药物》)

2. 治无名肿毒 一柱香适量,捣敷患处。(《贵州草药》)

0010 一点血 yī diǎn xuè (《四川中药志》)

【异名】 一点红(《四川中药志》),石鼓子、威氏秋海棠(《西昌中草药》),一口血(《恩施中草药手册》)。

【基原】 为秋海棠科秋海棠属植物一点血秋海棠的根茎。

【原植物】 一点血秋海棠 *Begonia wilsonii* Gagnep.

多年生草本,高 20~30 cm。根茎短而肥厚,横生,有环纹,断面红色,有须根。根出叶 1~2 片;叶柄长 6~11 cm,有棕色绒毛;叶片纸质,近菱形或斜卵圆形,长 10~15 cm,宽 10~12 cm,先端尖,基部斜心形,两侧不对称,上部 3~7