

癬诸疮之药也。此物质润性燥，濒湖方治疮疥仅供外涂，能润皮肤，杀虫止痒，不堪服食。粗工述庸人语，每治大风癩疾，与苦参同用，作丸服，殊不察此性燥、热劣，有损液闭痰之虞，而伤血分，至有风癩未愈而先失明者。用之外涂，其功不可没也。”

2. 《本草经疏》：“禀火金之气以生，故其味辛、苦，气热，有毒。辛能散风，苦能杀虫燥湿，温热能通行经络。世人用以治大风痲疾及风癩疥癩诸疮，悉此意耳。”

0189 大风药 dà fēng yào 《湖南药物志》

【异名】 叶青、纤序鼠李(《湖南药物志》)，皂布叶(《广西药用植物名录》)。

【基原】 为鼠李科鼠李属植物尼泊尔鼠李的根、茎。

【原植物】 尼泊尔鼠李 *Rhamnus nepalensis* (Wall.) Laws. [*Ceanothus napalensis* Wall.; *R. paniculiflorus* Schneid.]

直立或藤状灌木。枝无刺，幼枝被短柔毛，后脱落，小枝具多数明显的皮孔。叶互生；叶柄长 1.2~2 cm，无毛；叶片厚纸质或近革质，大小异形，小叶近圆形或卵圆形，长 2~5 cm，宽 1.5~2.5 cm；大叶宽椭圆形或椭圆状长圆形，长 6~17(~20) cm，宽 3~10 cm，先端圆形，渐尖，基部圆形，边缘具钝锯齿，上面深绿色无毛，下面仅脉腋被簇毛。腋生聚伞总状花序或下部有短枝的聚伞圆锥花序，长达 12 cm，花序轴被短柔毛；花单性，雌雄异株，5 基数；萼片长三角形；花瓣匙形；雌花的子房球形，3 室。核果倒卵状球形，基部有宿存的萼筒，具 3 分核。种子 3 颗。花期 5~9 月，果期 8~11 月。

生于海拔 1 800 m 以下的疏或密林中，或灌丛中。分布于西南及浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、西藏，台湾有引种。

本植物的叶(大风药叶)亦供药用，另设专条。

【采收加工】 5~8 月采茎，切段，晒干。9~10 月采根，切片，晒干。

【成分】 全株含蒽醌类化合物：大黄素(emodin)，大黄素甲醚(phycion)；黄酮类化合物：鼠李素(rhamnetin)，鼠李柠檬素(rhamnocitrin)，鼠李素-3-O- α -L-吡喃鼠李糖基(1 \rightarrow 2)-O- α -L-吡喃鼠李糖基(1 \rightarrow 6)- β -D-吡喃半乳糖苷[rhamnetin-3-O- α -L-rhamnopyranosyl(1 \rightarrow 2)-O- α -L-rhamnopyranosyl(1 \rightarrow 6)- β -D-galactopyranoside]，鼠李柠檬素-3-O- α -L-吡喃鼠李糖基(1 \rightarrow 3)-O- α -L-吡喃鼠李糖基(1 \rightarrow 6)- β -D-吡喃半乳糖苷[rhamnocitrin-3-O- α -L-rhamnopyranosyl(1 \rightarrow 3)-O- α -L-rhamnopyranosyl(1 \rightarrow 6)- β -D-galactopyranoside]。还含 β -谷甾醇(β -sitosterol)，羽扇脂醇(lupeol)， β -谷甾醇- β -D-葡萄糖苷(β -sitosterol- β -D-glucoside)等^[1]。

【药性】 《湖南药物志》：“微甘、涩，平。”

【功用主治】 《湖南药物志》：“祛湿，消水。主治风湿关节痛，慢性肝炎，早期肝硬化腹水。”

【用法用量】 内服：煎汤，10~30 g。



尼泊尔鼠李

【选方】 1. 治风湿关节痛 纤序鼠李根 15~30 g。水煎服。

2. 治慢性肝炎 纤序鼠李根、茎 30~60 g。水煎服，或加鸡蛋 2 枚煮食。半个月为 1 个疗程，停药数日后可再服。服后食欲明显增加。急性黄疸型肝炎加阴行草、田基黄各 30 g。

3. 治早期肝硬化 纤序鼠李根、茎 50 g，田基黄、半边莲各 45 g。水煎服。(1~3 方出自《湖南药物志》)

0190 大乌泡 dà wū pào 《云南中草药》

【异名】 老牛黄泡、乌泡(《云南中草药》)，大红黄泡(《中国植物志》)，多苞片悬钩子(《广西植物名录》)。

【基原】 为蔷薇科悬钩子属植物大乌泡的根或全株。

【原植物】 大乌泡 *Rubus multibracteatus* Lévl. et Vant.

灌木，高 2~3 m。茎粗壮，密被黄色绒毛和散生极短弯刺。单叶互生；叶柄长 3~6 cm，密被黄柔毛；托叶条裂；叶片革质，近圆形，直径 5~16 cm，掌状 7~9 浅裂，裂片常 2 浅裂或又有缺裂，先端圆钝或急尖，基部心形，边缘有不整齐锯齿，上面有短毛和密集的小凸起，下面密被黄色绒毛。圆锥花序或总状花序顶生和腋生，密生黄色绒毛；苞片椭圆形，边缘撕裂状；萼片卵形，先端常多裂，外面密生黄色绒毛；花瓣近椭圆形，白色，有爪；雄蕊多数；心皮多数，着生于凸起花托上。聚合果球形，上生多数红色浆果状小核果。花期 4~6 月，果期 8~9 月。

生于海拔 700~2 500 m 的山坡及沟谷阴处灌木林内或林缘及路边。分布于广东、广西、云南、贵州。

【采收加工】 9~12 月采挖根，切片，晒干。全年可采全株，晒干。

【成分】 果实含氨基酸：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，甲硫氨酸，异亮氨酸，亮氨酸，酪氨酸，苯丙氨酸，赖氨酸，组氨酸，精氨酸及脯氨酸^[1]。

【药性】 苦、微涩，凉。

1. 《云南中草药》：“涩、苦，凉。”

2. 《全国中草药汇编》：“苦、凉。”

【功用主治】 清热，止血，祛风湿。主治感冒发热，咳嗽咯血，鼻衄，月经不调，外伤出血，痢疾，腹泻，脱肛，风湿痹痛。

1. 《云南中草药》：“清热解毒，祛风活络，止血止痛。治感冒、高热、咳嗽带血、风湿关节痛、月经提前、腹泻、肠胃炎、痢疾、脱肛、外伤出血。”

2. 《全国中草药汇编》：“清热利湿。主治咯血，衄血，风湿骨痛，骨折。”

【用法用量】 内服：煎汤，10~30 g。外用：捣敷或研末敷。

【选方】 治外伤出血 用(大乌泡)叶研末撒于患处。(《云南中草药》)



大乌泡