

治愈 47 例,占 27.81%;3 次治愈 6 例,占 3.55%;4 次治愈 7 例,占 4.14%;5 次治愈 2 例,占 1.18%。全部带菌者均转为阴性<sup>[3]</sup>。

4. 治疗急慢性肾炎 用土牛膝根(柳叶牛膝)60 g,大锅水煎,煎取药液以能坐于盆中浸渍腰部为宜,趁热坐浴 20~30 min。然后用布包药渣敷贴两侧腰部,每次约 30 min(坐浴及敷贴若冷却,均可反复加温),每日 2 次,起床及临睡前各 1 次。共治疗 81 例,结果:临床治愈 58 例,显效 11 例,好转 6 例,无效 7 例。疗程最短 5 d,最长 6 个月,平均 40 d<sup>[4]</sup>。

【各家论述】《本草求真》:“杜牛膝气味更凉,嚼之味甘而不苦,主治多是解毒破血,泻热吐痰,较之川牛膝微觉有别。”

0153 **土田七** *tǔ tián qī*  
(《广西药用植物名录》)

【异名】小田七、竹田七、毛七、姜三七(《广西药用植物名录》),三七姜、姜叶三七、竹叶三七、姜七(《全国中草药汇编》),姜田七(《新华本草纲要》)。

【基原】为姜科土田七属植物土田七的块根和根茎。

【原植物】土田七 *Stahlianthus involucratus* (King ex Bak.) Craib [*Kaempferia involucrata* King ex Bak.; *K. hainanensis* Hayata]

多年生草本,高 15~30 cm。根茎块状,径约 1 cm,外面棕褐色,内面棕黄色,粉质,芳香而有辛辣味,根末端膨大成球形的块根。叶基生,通常 2~4 片;叶柄长 6~18 cm;叶片倒卵状长圆形或披针形,长 10~18 cm,宽 2~3.5 cm,绿色或染紫。花 10~15 朵聚生于钟状总苞中,总苞及花的各部有棕色、透明的小腺点;总花梗长 2.5~10 cm;小苞片线形,膜质;花白色,花冠裂片卵状长圆形;侧生退化雄蕊披针形;唇瓣圆形,白色,中央有杏黄色斑;花药长约 5 mm,花丝长 2~3 mm;药隔先端具长圆形附属体;花柱线形,柱头具缘毛,子房下位,卵形。花期 5~6 月。

野生于林下、荒坡或栽培。分布于福建、广东、广西、海南、云南等地。

【采收加工】7~11 月采挖,鲜用或置沸水中烫 1~2 min,捞出,晒干。

【药材】土田七 *Radix et Rhizoma Stahlianthi Involucrati* 主产于广西、云南、广东、海南等地。


性状 本品略呈扁圆锥形或纺锤形。表面灰棕色至棕红色,常皱缩,节密,具白色点状须根痕,节间长 1~2 mm。质硬脆,易折断,断面平坦,角质化,内皮层明显,灰白色或灰色,可见白色点状维管束。气微,味辛。

【药性】《广西中草药》:“辛,温。”

【功用主治】散瘀,止痛,止血。主治跌打瘀痛,风湿骨痛,吐血衄血,月经过多,外伤出血。

1. 《广西中草药》:“活血散瘀,消肿止痛。”

2. 《全国中草药汇编》:“主治跌打损伤,风湿骨痛,吐血



土田七

衄血,月经过多;外用治蛇虫咬伤,外伤出血。”

3. 《广西民族药简编》:“治骨哽喉,胃下垂,胃出血,产后流血过多,月经过多,咯血,血痢,胃寒痛,浸酒服治脾脏肿大,煨成炭水煎服,治月经不调,血崩,捣烂冲开水服治尿滞留,捣烂敷患处治跌打损伤,研末敷患处治刀伤出血。”

【用法用量】内服:煎汤,6~15 g;或浸酒。外用:捣敷;研末撒或调敷。

【选方】1. 治跌打损伤 姜叶三七 3~9 g,水煎服或浸酒内服;外用酒炒热敷患处。

2. 治吐血,衄血,月经过多 姜叶三七晒干,煨存性。用 3~9 g,水煎服。

3. 治外伤出血 姜叶三七炒炭,研粉,适量,撒患处。(1~3 方出自《广西中草药》)

0154 **土白及** *tǔ bái jí*  
(《西藏常用中草药》)

【基原】为兰科舌唇兰属植物二叶舌唇兰的块茎。

【原植物】二叶舌唇兰 *Platanthera chlorantha* Cust. ex Reichb. f. [*Habenaria chlorantha* Bab.]

陆生植物。高 30~50 cm。块茎 1~2 枚,卵状。基生叶 2 枚;叶椭圆形、倒披针状椭圆形,先端钝或急尖,基部收狭成鞘状柄,长 9~21 cm,宽 3~9 cm。总状花序,有花约 10 朵;苞片披针形;花白色,较大;中萼片卵状三角形,先端钝或平截,侧萼片椭圆形,较中萼片狭,急尖;花瓣偏斜,条状披针形,基部较宽,唇瓣条形,肉质,不裂;距弧曲,前部膨大,圆筒状,先端钝;子房细圆柱状,弧曲。

生于海拔 400~3 500 m 的山坡林下及山坡灌丛下。分布于华北、东北及河南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海等地。

【采收加工】8~10 月采挖,鲜用或切片晒干。

【药材】土白及 *Rhizoma Platantherae Chloranthae* 产于东北、华北及陕西、新疆、甘肃、青海等地。


性状 本品呈椭圆形、卵圆形或类圆形。大小不等。表面灰白色至淡黄白色,微显半透明,有凸凹不平的皱缩纹,有时为强皱缩。质致密而坚实,角质状,不易破碎,破碎面角质样,略具光泽,浅黄白色。本品湿润时呈黏液性。气微,味淡。

鉴别 粉末特征:呈灰白色或乳白色。薄壁细胞含众多粘着的淀粉团块。黏液细胞多数较大,含黏液质和针晶束。导管和管胞主为螺纹,直径 10~20 μm。稀见石细胞,壁孔沟明显。表皮细胞淡黄色,含油滴和小方晶。纤维长梭形。

【成分】含挥发油,挥发油含有姜三七酮(stahlianthusone)<sup>[1]</sup>。

【药性】《西藏常用中草药》:“性平,微苦。”

【功用主治】《西藏常用中草药》:“补肺生肌,化痰止血。治肺癆咳血,吐血,衄血;外敷治创伤,痈肿,烫火伤。”



二叶舌唇兰