

附生于树上。分布于广西、四川、云南。

【采收加工】 7~10月采收，蒸后晒干。

【成分】 全草含联苄类成分：卷瓣兰联苄定宁(cirrhoptalinin)，大叶兰酚(gigantol)^[1]，卷瓣兰联苄定(cirrhoptalinin)，卷瓣兰联苄宁(cirrhopetalinin)，山药素(batatasin)Ⅲ^[2]；还含菲类成分：卷瓣兰菲定(cirrhopetalanthridin)^[1]，卷瓣兰菲灵(cirrhopetalin)^[3]。

【药性】 《四川中药志》1960年版：“性温，味甘，无毒。”

【功用主治】 主治风湿痹痛，跌打损伤，咳嗽吐血，食积，虚劳。

1. 《民间常用草药汇编》：“治咳嗽吐血。”

2. 《四川中药志》1960年版：“驱风除湿，活血，消食积。治痨病，妇女虚弱及男子肾亏。”

3. 《四川常用中草药》：“治跌打损伤，小儿咳嗽，百日咳。”

【用法用量】 内服：煎汤，6~15 g；或浸酒。

【选方】 1. 治风湿痛 一匹草泡酒服。
2. 治女子虚弱 一匹草炖鸡或肉服。（1、2方出自《四川中药志》1960年版）

0003 一匹绸 yī pǐ chóu (《广西民间常用草药手册》)

【异名】 白面水鸡(《陆川本草》)，白背丝绸(《生草药手册》)，绸缎藤、银背藤(《广西药用植物名录》)。

【基原】 为旋花科白鹤藤属植物白鹤藤的茎叶。

【原植物】 白鹤藤 *Argyreia acuta* Lour. [A. festiva Wall.]

攀缘灌木。小枝通常圆柱形，被银白色绢毛。单叶互生；叶柄长1.5~6 cm，被银色绢毛；叶片椭圆形或卵形，长5~11 cm，宽3~8 cm，叶面无毛，背面密被银色绢毛，全缘；侧脉多至8对。聚伞花序腋生或顶生，总花梗及花梗均被银色绢毛；苞片椭圆形或卵圆形，外面被银色绢毛；花两性；花萼5，分内外两轮，萼片卵形，不等大；花冠漏斗状，白色，冠檐5深裂，花萼与花冠外面均被银白色绢毛；雄蕊5；子房近球形，2室，无毛，花柱长约2 cm，柱头头状，2裂。果实球形，红色，为增大的萼片包围，萼片内面红色。种子2~4颗，褐色。花期6~9月。

生于疏林下或路边灌丛中、河边。分布于广东、海南、广西等地。

本植物的根(白鹤藤根)亦供药用，另设专条。

【采收加工】 7~10月采收，鲜用或晒干。

【药材】 一匹绸 *Caulis et Folium Argyreiae Acutae* 主产于海南、广西。

性状 藤茎呈细圆柱形，常扭曲，长短不一，通常切成短段，长约5 cm，直径0.5~1.5 cm，表面暗灰棕色，有纵沟纹，断面淡棕色，木部可见针眼状小孔。叶卷曲或破碎，完整者展平后呈卵形至椭圆形，长5~11 cm，宽3~9 cm，先端锐尖或钝圆，基部圆形或微心形，上面暗棕色至紫色，下面浅灰绿色，贴生丝光毛，触之柔软；叶柄长2~3.5 cm。有时可见花序，花冠漏斗状，花序轴、花萼、花冠密被丝光

毛。质脆易碎。气微，味苦。

【药性】 《广西本草选编》：“味微苦、甘，性平。”

【功用主治】 瘀痹利水，散瘀止血，拔毒生肌。主治风湿痹痛，水肿，鼓胀，咳喘，吐血，带下，崩漏，跌打损伤，乳痈，疮疖脓肿，湿疹。

1. 《本草求原》：“叶敷烂脚，化腐疮。”

2. 《岭南采药录》：“治蛊胀，和米与黄糖捣烂，煎香食之。凡肿胀，和苍术煎汤熏蒸之。”

3. 《广西民间常用草药手册》：“理血，祛风，除湿。治跌打损伤，内外伤出血及妇女血崩，白带。”

4. 《全国中草药汇编》：“祛风利尿，化痰止咳，止血活络，拔毒生肌。主治肾炎水肿，肝硬化腹水，风湿疼痛，内伤吐血，急慢性支气管炎，外用治乳腺炎，疮疖脓肿，湿疹。”

【用法用量】 内服：煎汤，9~15 g。外用：捣敷或水煎洗。

【选方】 1. 治白带 一匹绸30 g，小榕树须15 g，鸡冠花30 g，水煎服。

2. 治崩漏 一匹绸叶、走马胎叶、龙芽草各30 g，捣烂，水煎服。

3. 治内伤吐血 一匹绸叶、虎杖、旱莲草、龙芽草各30 g，水煎服。

4. 治跌打积瘀，经络不和 一匹绸30 g，水煎冲酒服。（1~4方出自《广西民间常用草药手册》）

0004 一叶萩 yī yè qī (《中国药用植物志》)

【异名】 小粒蒿、横子、粉条、老鼠牙、马扫帚牙、小孩拳、叶下珠(《中国药用植物志》)，狗舌条(《东北木本植物图志》)，八颗叶下珠(《天目山药用植物志》)，山帚条(《吉林中草药》)，山扫条、老米饮(《全国中草药汇编》)。

【基原】 为大戟科叶底珠属植物叶底珠的嫩枝叶或根。

【原植物】 叶底珠 *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. [S. ramiflora (Ait.) Muell.-Arg.]

灌木，高1~3 m。茎丛生，多分枝，小枝绿色，纤细，有棱线，上半部多下垂；老枝呈灰褐色，平滑无毛。单叶互生，具短柄，叶片椭圆形或卵状椭圆形，全缘或具不整齐的波状齿或微被锯齿。3~12朵花簇生于叶腋；花小，淡黄色，无花瓣；单性，雌雄同株；萼片5，卵形；雄花花盘腺体5，分离，退化子房小，圆柱形；雌花花盘几不分裂，子房3室，花柱3裂。蒴果三棱状扁球形，熟时红褐色，无毛，裂成3瓣。花期5~7月，果期7~9月。

生于山坡或路边。分布东北、华东及河北、河南、湖北、广西、四川、贵州、陕西、台湾等地。

【采收加工】 嫩枝叶以5~7月采收为好，割取连叶的绿色嫩枝，扎成小把，阴干；根全年均可采，切片晒干。

【药材】 一叶萩 *Cacumen seu Radix Securinegæ Suffruticosæ* 主产于东北及河北、陕西、山东、江西、台湾、河南、湖北、广西、四川等地。

性状 嫩枝条呈圆柱形，略具棱角，长25~40 cm，粗端