

花柱内藏。坚果近球形或椭圆形，黄绿色，表面偶有分叉的纵纹。花期6~7月，果期8~9月。

生于荒坡草丛中或疏林下。分布于东北及河北、内蒙古、江苏、四川、云南、甘肃等地。

2. 露柱百蕊草 *T. himalense* Royle 又名：西域百蕊草（《云南中草药》）。

本种与长叶百蕊草的区别在于：茎平卧，枝、叶稀疏；叶线形，长2.5~3 cm；花近钟形；花柱外伸；坚果有不明显的纵脉。宿存花被内弯而皱缩。花期6月，果期8~9月。

生于海拔2900~3700 m的山坡草丛中及松林下。分布于四川、云南。

【采收加工】7~11月采收全草，晒干。

【药性】辛、微苦，凉。

1. 《云南中草药》：“甘、微苦，寒。”

2. 《云南中草药选》：“微辛，凉。”

【功用主治】解表清热，祛风止痉。主治感冒，中暑，腓肠肌痉挛，小儿肺炎，惊风，疳积。

1. 《云南中草药》：“退热解痉，消炎，杀虫。治小儿肺炎，咳嗽，肝炎，小儿惊风，血小板减少性紫癜，虫积，血吸虫病。”

2. 《全国中草药汇编》：“清热解痉，利湿消疳。治腓肠肌痉挛，风湿骨痛，小儿疳积。”

【用法用量】内服：煎汤，6~12 g。

【选方】1. 治腓肠肌痉挛，风湿疼痛 九仙草、过山龙各6 g，煎水点酒服。

2. 治小儿疳积，夜盲 九仙草研末，加糖煮，或蒸鸡蛋吃。（1、2方出自《昆明民间常用草药》）


0073 九头草 jiǔ tóu cǎo （《昆明民间常用草药》）

【异名】瞿麦、黄金铁、马柴胡、金柴胡、细叶独根、癞头参（云南）。


【基原】为石竹科蝇子草属植物细蝇子草、红细蝇子草的根或地上部分。

【原植物】1. 细蝇子草 *Silene tenuis* Willd. 又名：纤细鹤草（《秦岭植物志》），滇瞿麦、纤细蝇子草（《云南药品标准》），小九股牛（《昆明民间常用草药》）。

多年生草本，高30~60 cm。根稍肥厚成细圆锥形，长达33 cm，根头处留有多条茎的残基。数茎丛生，圆柱形，绿色，被短毛，节膨大。单叶对生；在基部簇生，茎生者2~3对，线状披针形或线形，长3~9 cm，宽1~4 mm，基部抱茎，全缘，



长叶百蕊草



露柱百蕊草

两面均被短毛；叶缘毛较多。花多数，成总状聚伞花序，小聚伞常只1花，小花梗中部常有苞片1对；花萼筒状，边缘具缘毛，有10脉，绿色或紫色；花瓣5，白色或淡黄色，条状，先端2裂；雄蕊10；子房长卵形，花柱3，线形。蒴果瓶状，6齿裂，外被宿萼。种子多数。花期8~9月，果期9~10月。

生于山坡、草丛中。分布于西南及河北、山西、内蒙古、山东、陕西、青海、新疆等地。

2. 红细蝇子草 *S. tenuis* Willd. var. *rubescens* Franch.

又名：紫茎九头草、大花蝇子草（《云南种子植物名录》），竹节防风（《昆明民间常用草药》），鸡舌草（《云南中草药》）。

本种与上种的主要区别在于：茎带紫色，花呈浅红色。分布于四川、云南等地。

【采收加工】9~11月采挖根部，晒干或切片晒干；或夏、秋季花尚未开放时割取地上部分，扎把，晒干。

【药材】九头草 *Radix Seu Herba Silenis Tunuis* 产于云南、四川、河北、山东、山西、内蒙古、青海及新疆等地。

性状 根圆锥形，根头留有茎基；表面灰黄色或灰褐色，具细纵皱纹；质坚硬，气微，味淡。地上部分全草长30~50 cm。茎多分枝，圆柱形，直径2~3 mm，表面淡绿色或黄绿色，下部带紫红色，被有短毛，节膨大；质脆，易折断，断面中空。叶对生，卷缩，完整者呈线形，黄绿色，全缘，两面均被短毛，基部呈短鞘抱茎。花单生于叶腋，多萎缩，花梗长1~2 cm，下部有一对苞片，展开后可见花瓣5枚，线形，先端2裂，淡粉红色；气微，味微苦。

【药性】苦、辛，平。

1. 《云南中草药》：“麻、微甘、辛，温。”

2. 《全国中草药汇编》：“性平，味苦。”

【功用主治】清热利湿，活血调经，止血。主治热淋，血淋，小便不利，痢疾，月经不调，经闭，崩漏，外伤出血。

1. 《云南中草药》：“活血调经，止血接筋。主治外伤出血，月经不调，崩漏，久痢。”

2. 《全国中草药汇编》：“清热，利尿，通经。主治小便不利，尿痛尿血，经闭。”

【用法用量】内服：煎汤，5~10 g。外用：捣敷；或研末撒。

【选方】1. 治久痢 用（鸡舌草）全株研末，每次9~15 g，红痢加白糖，白痢加红糖，开水送服。

2. 治外伤出血 用（鸡舌草）根研末撒布患处。（1、2方出自《云南中草药》）

0074 九里香 jiǔ lǐ xiāng （《岭南采药录》）

【异名】满山香、千里香（《生草药性备要》），五里香（《陆川本草》），过山香（《福建中草药》），千只眼（《文山中草药》），水万年青（《南宁市药物志》）。

【基原】为芸香科九里香属植物九里香和千里香的叶和带叶嫩枝。



细蝇子草