

【药性】 辛、微涩，温。

【功用主治】 散瘀，解毒，杀虫。主治风湿浮肿，无名肿毒，癩癣。

1. 《贵州民间药物》：“散瘀，杀虫。”

2. 《全国中草药汇编》：“解毒，杀虫。外用治疮疖肿毒，头癣。”

【用法用量】 内服：煎汤，10~15 g。外用：捣敷；或磨汁涂。

【选方】 1. 治风湿浮肿 八角香 30 g，三角风、海金沙藤各 15 g，煎水外洗与内服。

2. 治无名肿毒 八角香适量，捣绒，敷患处。

3. 治癩癣 八角香适量，磨酒或醋，搽患处。(1~3方出自《贵州民间药物》)

0044 八角莲 bā jiǎo lián (《植物名实图考》)

【异名】 鬼臼、爵犀、马目毒公、九臼(《本经》)，天臼、解毒(《别录》)，害母草(《本草图经》)，独脚莲、独荷草(《土宿本草》)，羞天花、术律草、琼田草、山荷叶、旱荷、八角盘(《纲目》)，金星八角、独叶一枝花(《汪连仕草药方》)，八角连(《纲目拾遗》)，金魁莲(《分类草药性》)，八角乌(《中药志》)。


【基原】 为小檗科八角莲属植物八角莲、六角莲和川八角莲的根及根茎。

【原植物】 1. 八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng ex Ying 又名：江边一碗水(《湖南药物志》)，一把伞(广东、广西)。


多年生草本，高 20~30 cm。茎直立，不分枝，无毛，淡绿色。根茎粗壮，横生，具明显的碗状节。叶 1 片，有时 2 片，盾状着生；叶柄长 10~15 cm；叶片圆形，直径约 30 cm，边缘 4~9 浅裂或深裂，裂片楔状长圆形或卵状椭圆形，先端锐尖，边缘具针刺状锯齿，下面密被或疏生柔毛。花 5~8 朵排成伞形花序，生于近叶柄基处的上方近叶片处；花梗细，长约 5 cm，花下垂，花冠深红色；萼片 6，外面被疏毛；花瓣 6，勺状倒卵形；雄蕊 6，药隔突出；子房上位，1 室，柱头大，盾状。浆果椭圆形或卵形。种子多数。花期 4~6 月，果期 8~10 月。

生于海拔 300~2 200 m 的山坡林下阴湿处。分布于浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

2. 六角莲 *D. pleian-*



八角莲



六角莲

tha (Hance) Woods. [*D. hispida* (Hao) Chun] 又名：八角金盘(《江西草药》)，一碗水、八角七(《秦岭巴山天然药物志》)。

本种与八角莲的区别为：叶通常 2 片，对生，叶片长圆形或近圆形，6~9 浅裂，裂片宽三角状卵形。花生于两茎生叶柄的交叉处。

生于海拔 600~1 600 m 的山坡林下阴湿处。分布于浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南、台湾等地。

3. 川八角莲 *D. veitchii* (Hemsl. et Wils.) Fu ex Ying 又名：山荷叶、五朵云(《云南种子植物名录》)，八角金盘、金盘、银盘独脚莲(四川)。

本种与八角莲的区别为：茎多汁，基部密被棕色大鳞片。叶互生，纸质，2 片；叶片圆形，直径约 20 cm，6~8 掌状深裂几达中部，裂片楔状矩圆形，先端常 3 裂，小裂片三角形，叶中部红棕色，下面叶脉有疏柔毛，后变无毛。花 2~6 朵，从生于茎顶叶柄分叉处的腋间。花期 4~6 月，果期 8~10 月。



川八角莲

生于海拔 1 200~2 200 m 的山地阴湿林下。分布于四川、贵州、云南。

以上 3 种植物的叶(八角莲叶)亦供药用，另设专条。

【栽培】 生物学特性 喜阴凉潮湿，忌强光，怕干旱。宜选肥沃、富含腐殖质的砂质壤土栽种。

繁殖方法 种子繁殖或分株繁殖。种子繁殖：8~10 月采集成熟果实，搓去外皮，收集种子。穴播，覆草保湿。分株繁殖：2~3 月挖取老根茎，截成 12~15 cm 长小段，按行株距各 30~35 cm 穴栽，每穴 1 段，覆土，浇水定根。4~11 月均可移栽。

田间管理 可利用林下空地阴凉处栽培，如无良好自然荫蔽条件，则需搭矮棚遮阳。生长期注意浇水，保持土壤湿润。春季多施氮肥，夏季多施腐熟有机肥。秋、冬季以厩肥、草皮灰混合培土越冬。

【采收加工】 9~11 月采收，鲜用或干燥，切忌受潮。

【药材】 八角莲 *Rhizoma et Radix Dysosmae* 八角莲主产于湖北、四川；六角莲主产于浙江、安徽、湖北；川八角莲主产于四川、贵州、云南。

性状 八角莲 根茎横生，数个至十数个连成结节状，每一结节圆盘形，直径 0.6~4 cm，厚 0.5~1.5 cm。表面黄棕色，上方具大型圆凹状茎痕，周围环节明显，同心圆状排列，色较浅，下方有环节及不规则皱纹或裂纹；可见圆点状须状根痕或须根，直径约 1 mm，浅棕黄色。质极硬，不易折断，折断面略平坦，颗粒状，角质样，浅黄红色，横切面平坦，可见维管束小点环列。气微，味苦。

六角莲 根茎结节数较少，结节圆球形，直径 0.5~1 cm。表面黄棕色，上方具凹陷茎痕或突起芽痕，周围环节同心圆状排列，有时可见残留鳞叶、芽痕，下方有须根