

3.《河北中草药》：“苦、甘、涩，寒。”

【功用主治】 清热利湿，解毒消肿。主治肺热咳嗽，湿热泻痢，热淋，风湿关节痛，痈疽肿毒，疔疮，虫蛇咬伤，烧烫伤，外伤出血。

1.《贵州民间药物》：“治风湿麻木。”

2.《江西草药》：“清热解毒，消肿散结。”

3.《贵州草药》：“驱风除湿，止咳喘，解毒。”

4.《北方常用中草药手册》：“能消炎，解毒，利水。治尿路感染，浮肿，乳痈，疔疮，淋巴结结核，无名肿毒，鲜品捣烂外敷，可治毒蛇咬伤。”

5.《四川中药志》1982年版：“清热利湿，解毒消肿，止咳，止血。主治湿热泻痢，热淋，下肢关节红肿疼痛，肺热咳嗽，烧烫伤，外伤出血。”

6.《中国民族药志》：“消食化积，行气止痛，清热解毒，止痢。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30g；或泡酒。外用：捣敷。

【选方】 1. 治慢性肠炎 大丁草、仙鹤草各15g。煎服。每日2次，1~2d为1个疗程。（《中国民族药志》）

2. 治湿热泻痢 大丁草、铁苋、三棵针各15g。水煎服。

3. 治肺热咳嗽 大丁草、兔耳草（毛大丁草）、桑白皮各15g。水煎服。（2、3方出自《四川中药志》1982年版）

4. 治毒蛇咬伤 丁萝卜（鲜）适量，雄黄少许，捣烂，加口涎调匀，敷伤口周围。另用丁萝卜根（鲜）9g嚼烂，冷开水送服。（《江西草药》）

5. 治外伤出血 ①大丁草适量。研末，撒伤口。（《全国中草药汇编》）②大丁草、马兰叶、白及各等分。研末，撒布患处。（《四川中药志》1982年版）

6. 治风湿麻木 豹子药30g。泡酒服，适量。（《贵州草药》）

0187 大木通 dà mù tōng （《植物名实图考》）

【异名】 接骨丹（《植物名实图考》），白头公公（《陕西中草药》），黄藤通、丝瓜藤（《湖南药物志》），银叶铁线莲（《秦岭植物志》）。


【基原】 为毛茛科铁线莲属植物粗齿铁线莲的茎藤。

【原植物】 粗齿铁线莲 *Clematis argentea* (Lévl. et Vant.) W. T. Wang [*C. grata* Wall. var. *grandidentata* Rehd. et Wils.]

落叶藤本。小枝密生白色短柔毛，老时外皮剥落。叶对生，一回羽状复叶；叶柄长3.5~6.5cm；小叶通常5枚，小叶片卵形或椭圆状卵形，长5~10cm，宽3.5~6.5cm，先端渐尖，基部圆形、宽楔形或微呈心形，常有不明显3裂，边缘有粗大锯齿状牙齿，两面被短柔毛，有时较疏。腋生聚伞花序，常有3~7朵花；萼片4，开展，直径2~

3.5cm，白色，近长圆形；花瓣无；雄蕊多数，无毛；心皮多数，被柔毛。瘦果扁卵圆形；宿存花柱羽毛状，长达3cm。花期5~7月，果期7~10月。

生于海拔450~3200m的山坡或山沟灌木丛中。分布



粗齿铁线莲

于河北、山西、安徽南部、浙江北部、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西南部、甘肃南部和东部。

【采收加工】 全年均可采收，除去枝叶及粗皮，切成小段，晒干。

【药材】 大木通 *Caulis Clematidis Argenteae* 产于四川、湖南、陕西等地。

性状 茎圆柱形，表面有6个粗大的纵棱和6个纵槽，每个大纵棱有多个细纵棱，每个槽中有2个细纵棱。粗皮呈长片状层层纵向脱落。横切面皮部有6处内陷，木部黄白色，导管孔较大。鲜品横切面有灰黑色或灰黄色胶质物。气微，味微苦。

【药性】 《四川中药志》1960年版：“性平，味涩，无毒。”

【功用主治】 利尿，解毒，祛风湿。主治小便不利，淋病，乳汁不通，疮疖肿毒；亦治风湿性关节疼痛，肢体麻木。

1.《植物名实图考》：“茎利小便。”

2.《四川中药志》1960年版：“杀虫解毒。治失音声嘶，杨梅疮毒，虫疮久烂及难产横生。”

3.《湖南药物志》：“发汗，利尿，通窍。治风湿性关节痛，四肢麻木，淋病尿血。”

【用法用量】 内服：煎汤，6~12g。外用：捣敷；或煎汤洗。

【宜忌】 孕妇慎用。

【选方】 1. 治淋病尿血 黄藤通、车前草各9~15g，水煎，兑白糖服。（《湖南药物志》）

2. 治疮毒 鲜大木通，捣绒外敷。（《成都中草药》）

0188 大风子 dà fēng zǐ （《本草衍义补遗》）

【异名】 大枫子（《品汇精要》），麻风子（《全国中草药汇编》），驱虫大风子（《台湾药用植物志》）。

【基原】 为大风子科大风子属植物大风子、海南大风子的成熟种子。

【原植物】 1. 大风子 *Hydnocarpus anthelminticus* Pierre

常绿乔木。树干直立，枝伸长。叶革质，互生；叶柄长0.6~3cm；叶片长椭圆形或椭圆状披针形，长10~30cm，宽3~7cm，先端钝尖，基部钝圆，全缘，两面无毛。花杂性或单性，1至数朵簇生，花径约2cm；雄花萼片5，卵形，花瓣5，卵形，黄绿色，能育雄蕊5个，外轮雄蕊通常退化成鳞片状，中央有退化子房；雌花的退化雄蕊合生成纺锤状体，子房卵形，被长硬毛，花柱粗短，被柔毛，柱头5裂，常成冠状反卷。浆果球形，直径6~12cm，果皮坚硬。种子30~50颗，卵形，略呈多角体状，外种皮角质，胚乳丰富。花期1~3月。

我国台湾、海南及云南等地有栽培。原产东南亚地区及印度等地。

本植物种仁的脂肪油（大风子油）亦供药用，另设专条。

2. 海南大风子 *H. hainanensis* (Merr.) Sleum [*Tarakogenos hainanensis* Merr.]



大风子