

药选》，小白药（《全国中草药汇编》）。

【基原】为萝藦科牛奶菜属植物大白药的全株。

【原植物】大白药 *Marsdenia griffithii* Hook. f.

粗壮木质藤本。茎灰褐色，有皮孔；小枝灰绿色，干后髓中空。节间长达6 cm。叶对生；叶柄长达4 cm；叶片宽卵形，长7~10 cm，宽5~7 cm，先端钝尖，基部近心形。团集聚伞花序腋生，多数叠生；花萼5裂，内面基部有5个腺体；花冠白色，近钟形，花冠裂片5，向右覆盖；副花冠裂片钻状或狭披针形；花粉块1个，直立；子房无毛，柱头伸出花冠喉部之外。蓇葖果木质，长圆状，长达9 cm，直径约4 cm。种子扁，先端具白色绢质的种毛。花期秋季，果期冬季。

生于山地密林中。分布于云南南部。

【采收加工】全年均可采，切碎，晒干或鲜用。

【成分】茎含4种三萜：大白药醇（griffithol），齐墩果酸（oleanolic acid），龙吉昔元（longispinogenin）和墨西哥仙人掌皂昔元（chichipegenin）^[1]。

【药性】《云南中草药》：“麻、苦、涩，凉，有毒。”


【功用主治】止血接骨。主治外伤出血，骨折，疮毒。

【用法用量】外用：研末撒；或鲜品捣敷。

【选方】1. 治外伤出血 大白药根研末，撒于患处。

2. 治骨折 大白药全株鲜品适量，捣烂加酒加温后外敷患处。

3. 治疮毒 大白药鲜品捣烂外敷患处。（1~3方出自《云南中草药选》）



大白药


0195 大头陈 dà tóu chén （《岭南采药录》）

【异名】千锤草、乌头风、土夏枯草（《广东中药》），假薄荷、黑头草、神曲草（广州空军《常用中草药手册》），地松茶、石棘（广州部队《常用中草药手册》）。

【基原】为玄参科毛麝香属植物球花毛麝香的带花全草。

【原植物】球花毛麝香 *Adenosma indianum* (Lour.) Merr.

一年生草本，高1 m左右。全株被多细胞柔毛。茎直立，单生或分枝。叶对生；具短柄，半抱茎；叶片椭圆形，长3~5 cm，先端钝，边缘有细锯齿、背面有小腺点。穗状花序短而近头状，顶生或腋生；苞片披针形；花无梗；小苞片2，丝状；萼片5，分生，狭披针形；花冠紫色或深蓝紫色，上唇直立，卵圆形，先端凹



球花毛麝香

缺，下唇扩展，3裂；雄蕊4，前面一对略长，花药仅1室发育。蒴果卵形，为宿存花萼所包，棕褐色。花果期10月。

生于山坡、旷野、草丛中。分布于广东、广西、云南。

【采收加工】10月开花时采收，切段，晒干或鲜用。

【药材】大头陈 *Herba Adenosmae Indiani* 主产于广东等地。

性状 根呈须状，地上部分被毛。茎类方柱形，有分枝；表面棕褐色或黑褐色，具细纵纹，节稍膨大；质稍韧，断面黄白色，中空。叶对生，有柄；叶片多脱落或皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或长卵圆形，先端钝，基部楔形，边缘有锯齿。穗状花序顶生或腋生，呈球状或长圆状；花萼筒状5裂；花冠多脱落。气香，味辛凉、微苦。

【成分】全草含挥发油，主要有蒎烯（pinene），柠檬烯（limonene），芳樟醇（linalool），对聚伞花素（*p*-cymene）和小茴香酮（fenchone）等^[1]。

【药理】抗菌消炎作用 本品含挥发油0.4%，已鉴定的35个成分多半是抗菌、消炎的活性成分。例如，主要成分之一的对聚伞花素有明显的祛痰作用；另一主要成分芳樟醇对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌和肺炎链球菌等有较强的抑制作用，对大鼠蛋清性关节炎有与氯化可的松相似的抗炎作用；小茴香酮也是油中主成分之一，是樟脑的异构体，具有似樟脑的局部刺激作用^[1]。

【药性】辛、微苦，平。

1. 《广东中药》：“味香辛，性平微凉。”

2. 广州部队《常用中草药手册》：“辛、微苦，凉。”

3. 《全国中草药汇编》：“辛、微苦，微温。”

【功用主治】疏风解表，化湿消滞。主治感冒头痛，发热，腹痛泄泻，消化不良。

1. 《岭南采药录》：“发表祛风，治外感头痛。”

2. 《广东中药》：“祛风，散热，解毒。治外感伤风、伤寒、伤暑及皮肤热毒，水土不服。”

3. 广州部队《常用中草药手册》：“疏风解表，芳香化浊。主治感冒，咳嗽，发热头痛。”

【用法用量】内服：煎汤，15~30 g，鲜品倍量。外用：鲜品，捣敷。


0196 大血藤 dà xuè téng （《简易草药》）

【异名】血藤（《本草图经》），过山龙（《纲目》），红藤（《景岳全书》），千年健、血竭、见血飞（《简易草药》），血通（《血症论》），大活血（《植物名实图考》），黄省藤、红血藤（《浙江民间常用草药》），血木通（《中药志》）。

【基原】为木通科大血藤属植物大血藤的藤茎。

【原植物】大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils. [*Holboellia cuneata* Oliv.]

落叶木质藤本，长达10 m。茎圆柱形，褐色扭曲，砍断时有红色液汁渗出。三出复叶互生；有长柄；中间小叶倒卵形，长7~12 cm，宽3~7 cm，侧生小叶较大，斜卵形，先端尖，基部两侧不对称。花单性，雌雄异株，总状花序



大血藤