

**【药性】** 辛、酸，凉。

1. 《四川中药志》1979年版：“酸、苦，寒。”

2. 《福建药物志》：“辛，凉。”

**【功用主治】** 截疟，消食，清热解毒，祛痰散结。主治疟疾，食积腹胀，咽喉肿痛，皮肤癩癩，疮疖肿毒，癰瘤。

1. 《全国中草药汇编》：“截疟退热，消积和中。主治疟疾，食积不化，胸腹胀满。”

2. 《四川中药志》1979年版：“涌吐痰涎。用于咽喉肿痛。”

3. 《浙江药用植物志》：“祛痰。治颈项癰瘤。”

**【用法用量】** 内服：煎汤，6~12 g。外用：捣敷；或研末调擦；或煎水洗。

**【选方】** 1. 治疟疾 ①(伞花八仙)干根 15~18 g，研细，用鸡蛋 1~3 枚，拌和后，煎成淡味蛋饼，在发冷前 1 h 一次吃完。(《天目山药用植物志》)②(土常山)根 9 g，柴胡、首乌各 18 g，黄芩、半夏、生姜各 9 g。水煎服。(《湖南药物志》)

2. 治跌伤肿痛，疮疖肿毒 (土常山)鲜根捣烂敷。(《湖南药物志》)

3. 治咽喉肿痛 腊莲绣球 10 g，水煎，含咽。

4. 治癩癩 腊莲绣球、千里光各适量。水浓煎，洗。(3、4 方出自《四川中药志》1979 年版)

### 0167 土碎补 *tǔ suì bǔ* 《新华本草纲要》

**【异名】** 猴子蕨(《广西药用植物名录》)，水龙骨(《中国药用孢子植物》)，阿里山水龙骨(《台湾植物志》)。

**【基原】** 为水龙骨科水龙骨属植物友水龙骨的根茎。

**【原植物】** 友水龙骨 *Polypodiodes amoenum* (Wall. ex Hook.) Ching [*Polypodium amoenum* Wall.]

植株高 25~70 cm。根茎长而横生，粗壮，密被褐棕色、披针形粗筛孔状鳞片。叶远生；叶柄长 10~20 cm，禾秆色，光滑，基部以关节着生于根茎；叶片纸质，长圆披针形，长 15~40 cm，宽 8~20 cm，先端尾尖，基部略变狭，叶轴和中脉下部疏被棕色、卵圆形粗筛孔状鳞片，羽状深裂几达叶轴；羽片 15~25 对，长圆披针形，长 5~8 cm，宽 1~2 cm，钝尖头，边缘有缺刻状锯齿；叶脉明显，中脉两侧各有 1 行整齐的网眼。孢子囊群圆形，着生于网眼内小脉的先端，在中脉两侧各成 1 行；无囊群盖。

附生于海拔 400~2 700 m 的常绿阔叶林中树干或岩石上。分布于西南及安徽、江西、湖北、广东、广西、台湾等地。


**【采收加工】** 8~12 月挖取根茎，晒干。

**【成分】** 全草含  $\beta$ -谷甾醇( $\beta$ -sitosterol)，22(29)-何帕烯(chop-22(29)-ene)，9(11)-羊齿烯[fern-9(11)-ene]等<sup>[1]</sup>。

**【药性】** 微苦，凉。

1. 《全国中草药汇编》：“甘、苦，平。”

2. 《中国药用孢子植物》：“微苦，凉。”



友水龙骨

**【功用主治】** 舒筋活络，清热解毒，消肿止痛。主治风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮毒。

1. 《全国中草药汇编》：“清热解毒，祛风除湿。主治风湿关节疼痛，咳嗽，小儿高烧。外用治背痛，无名肿毒，骨折。”

2. 《中国药用孢子植物》：“舒筋活络，止痛。用于关节疼痛，跌打损伤等。”

**【用法用量】** 内服：煎汤，6~15 g。外用：研末撒；或鲜品捣敷。

**【选方】** 1. 治关节痛 水龙骨 30 g。水煎，加适量酒服。

2. 治跌打损伤 水龙骨 30 g。煎服。外用捣烂，敷患处。(1、2 方出自《中国药用孢子植物》)

### 0168 土蜂子 *tǔ fēng zǐ* 《本经》

**【基原】** 为土蜂科土蜂属动物赤纹土蜂 *Scolia vittifrons* Sau. 和胡蜂科黄胡蜂属动物环黄胡蜂 *Vespa koreensis orbata* Buysson 的未成熟幼虫。

**【原动物】** 参见“土蜂”条。

**【采收加工】** 繁殖季节，掘出蜂巢，取幼虫，晒干。

**【药性】** 甘，凉，有毒。

1. 《日华子》：“凉，有毒。”

2. 《绍兴本草》：“味甘，平，无毒。”

**【功用主治】** 祛风，止惊，解毒消肿。主治小儿惊风，风疹瘙痒，咽喉肿痛，痈肿，丹毒，产妇乳汁不下。

1. 《本经》：“主痈肿。”

2. 《别录》：“主嗌痛。”

3. 《本草拾遗》：“主丹毒，风疹，腹内留热，大小便涩，去浮血，妇人带下，下乳汁。”

**【用法用量】** 内服：研末，1.5~3 g；或入丸剂。

**【宣忌】** 1. 《本草经集注》：“畏黄芩、芍药、牡蛎。”

2. 《日华子》：“有食之者，须以冬瓜及苦荬、生姜、紫苏以制其毒。”

**【选方】** 治急风 土蜂子二七枚(微炒)，干蝎二七枚(全者，生用)，雄黄半两(细研)，牛黄一分(细研)。上件药，都研极细，用粳米饭和丸如梧桐子大。不计时候，以温酒研下五丸。(《圣惠方》)

### 0169 土囷儿 *tǔ luán ér* 《救荒本草》

**【异名】** 地栗子(《救荒本草》)，土子、土蛋(《贵州民间草药》)，九牛子(江西《草药手册》)，九子羊(《中国高等植物图鉴》)。

**【基原】** 为豆科土囷儿属植物土囷儿的块根。

**【原植物】** 土囷儿 *Apios fortunei* Maxim.

多年生缠绕草本。有球状块根。茎有稀疏白色短毛。奇数羽状复叶，总叶柄长 6~8 cm，有毛；托叶及小托叶早落；小叶 3~7 枚，卵形或宽披针形，长 3~7 cm，宽 1.5~4 cm，先端急尖，有短尖头，基部圆形。总状花序腋生，长 6~26 cm，苞片及小苞片线形，有白色短毛；花萼为二唇形，无毛；花冠蝶形，绿白



土囷儿