

【成分】 茎叶含堇菜苷(violatoside)^[1]。

花含黄酮:芸香苷(rutin)^[2],三色堇黄酮苷(violanthin)^[3];类胡萝卜色素:番茄烃(lycopene),六氢番茄烃(phytofluene), β -胡萝卜素(β -carotene)^[4],叶黄素(xanthophyll, lutein)^[5],堇黄质(violaxanthin),9,9',9,13',9,15和9,13-二-顺式-堇黄质(di-cis-violaxanthin)四种异构体^[6],9,13和15-顺式-堇黄质(cis-violaxanthin),花药黄质(antheraxanthin),9,9'-顺式-花药黄质(9,9'-cis-antheraxanthin),黄体呋喃素(luteoxanthin)^[7],异堇黄质(auroxanthin)^[3]。

全草含黄酮类:槲皮素(quercetin),木犀草素(luteolin),木犀草素-7-葡萄糖苷(luteolin-7-glucoside)^[8];酚酸类:原儿茶酸(protocatechuic acid),咖啡酸(caffei acid),顺式及反式的对香豆酸(*p*-coumaric acid),对羟基苯甲酸(*p*-hydroxybenzoic acid),对羟基苯乙酸(*p*-hydroxyphenylacetic acid),水杨酸(salicylic acid),香草酸(vanillic acid)^[8,9],龙胆酸(gentisic acid)^[9]和痕量的丁香酸(syringic acid),阿魏酸(ferulic acid)^[8];还含多糖^[10]。

【药理】 对糖代谢的影响 三色堇可减少葡萄糖转运,轻微减少蔗糖的水解速率及所产生的己糖和水的吸收^[1]。

【药性】 《中国药用植物图鉴》:“苦,寒。”

【功用主治】 清热解毒,止咳。主治疮疡肿毒,小儿湿疹,小儿瘰疬,咳嗽。

1. 《中国药用植物图鉴》:“为止咳剂,苏联民间用治小儿瘰疬。”

2. 《湖南药物志》:“解毒清血。”

3. 《台湾药用植物志》:“全草对小儿皮肤病患者,为清血药;昔日用为利尿药及发汗药,或作轻泻剂。治皮肤病(湿疹),腺病质。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g。外用:捣敷。

0110 三角泡 sān jiǎo pào 《广西中药志》

【异名】 假苦瓜(《生草药性备要》),假蒲达(《本草求原》),包袱草、风船葛(《广州植物志》),鬼灯笼、三角灯笼(《广西中药志》),金丝苦棟、三角藤、倒地铃(《广西中草药》),粽子草(《福建中草药》),炮掌果(《云南中草药》),小果倒地铃(《常用中草药彩色图谱》),白花仔草(《台湾药用植物志》)。

【基原】 为无患子科倒地铃属植物倒地铃的全草或果实。

【原植物】 倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L. [*C. halicacabum* L. var. *microcarpum* (Kunth) Bl.; *C. microcarpum* Kunth]

草质攀缘藤本,长1~5 m。茎、枝绿色,有5或6棱和同数的直槽,棱上被皱曲柔毛。二回三出复叶;叶柄长3~4 cm;小叶近无柄,顶生的斜披针形或近菱形,长3~8 cm,宽1.5~2.5 cm,先端渐尖,侧生的稍小,卵形或长椭圆形,边缘有疏锯齿或羽状分裂,下面中脉和侧脉上被疏柔毛。花雌雄同株或异株;圆锥花序少花,总花



倒地铃

梗直,长4~8 cm,卷须螺旋状;萼片4,被缘毛,内面2枚比外面2片约长1倍;花瓣4,乳白色,倒卵形;雄蕊(雄花)8,与花瓣近等长或稍长,花丝被疏而长的柔毛;子房(雌花)倒卵形或有时近球形,被短柔毛。蒴果梨形、陀螺状倒三角形,褐色,被短柔毛;种子黑色,有光泽,种脐心形。花期夏秋,果期秋季至初冬。

生于田野、灌丛、路边和林缘;也有栽培。我国东部、南部和西南部很常见。

【栽培】 生物学特性 喜温暖湿润的气候,较耐旱,忌积水。对土壤要求不严,以疏松、肥沃的砂质壤土生长茂盛。

繁殖方法 种子繁殖。冬季果实成熟,干时三瓣开裂,种子圆形,黑色,晾干放布袋里置通风处贮藏。翌年3月播种,均匀撒播于苗床上,覆土1 cm,盖草,浇水保持湿润。幼苗出土应及时揭去盖草,苗高10~15 cm时,以25 cm×25 cm的行株距开穴定植,每穴种1或2株。亦可直播,每穴播3或4颗种子。

田间管理 移栽后,每月追肥1次,每次追肥结合中耕除草,直至封行。干旱时要浇水抗旱。

【采收加工】 夏、秋季采收全草,秋、冬季采收果实,晒干。

【药材】 三角泡 *Herba seu Fructus Cardiospermi Halicacabi* 主产于西南地区及广东、广西、台湾等地。

性状 本品茎粗2~4 mm,黄绿色,有深纵沟槽,分枝纤细,质脆,易折断,断面粗糙。叶多脱落,破碎而仅存叶柄,二回三出复叶,小叶卵形或卵状披针形,暗绿色。花淡黄色,干枯,与未成熟的三角形蒴果附于花序柄顶端,下方有卷须。蒴果具3翅,膜质,膨胀成倒卵形,有三棱,先端截头状,常被柔毛。种子球形,表面灰黑色。气微,味稍苦。

【成分】 种子含脂肪酸:花生酸(arachidic acid),亚油酸(linoleic acid),硬脂酸(stearic acid),还含 β -谷甾醇(β -sitosterol),木犀草素-7-O-葡萄糖醛酸苷(luteolin-7-O-glucuronide)^[1]。

【药理】 稳定溶酶体膜的作用 三角泡的乙醇和水提取物能稳定炎症期间的溶酶体膜,抑制溶酶体内酶的漏出,从而阻止细胞内和细胞外的损伤^[1]。

【药性】 苦、辛,寒。

1. 《生草药性备要》:“味苦,性寒。”

2. 《本草求原》:“甘、苦,寒。”

3. 《福建药物志》:“辛,凉。”

【功用主治】 清热利湿,凉血解毒。主治黄疸,淋证,湿疹,疔疮肿毒,毒蛇咬伤,跌打损伤。

1. 《生草药性备要》:“凉血消疮,去黄气,理蛇伤。”

2. 《岭南采药录》:“煎水洗疥癩。”

3. 《广西中药志》:“治小儿头疮及小泡疮。”

4. 《广西本草选编》:“化湿解毒。”

5. 《全国中草药汇编》:“散瘀消肿,凉血解毒。主治跌打损伤,疮疖痈肿,湿疹,毒蛇咬伤。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15 g,鲜品30~60 g。外用:捣敷;或煎汤洗。

【宜忌】 《全国中草药汇编》:“孕妇忌服。”

【选方】 1. 治诸淋 干倒地铃9 g,金钱薄荷6 g。煎汤服。(《泉州本草》)

2. 治腋疮疖,湿疹,烂疮 风船葛、扛板归各适量。水煎,洗患处。

3. 治小儿阴囊热肿 风船葛适量。水煎,洗患处。(2、3