

色，近光滑；叶片草质，披针形，长7~15 cm，宽3~4 cm，基部不变狭，二回羽状；羽轴和叶轴两侧有狭翅，叶轴上面有1条纵沟；羽片约10对，互生，平展，长圆形至卵状三角形，钝头，长2 cm，宽约1 cm；小羽片2~3对，倒卵形，圆头，基部上侧1片先出，较大，向上各小羽片渐小；叶脉羽状，每齿有1条小脉，不达齿端。孢子囊群长线形，每小羽片有1~3个，背生于小脉中部以下；囊群盖线形，膜质，全缘，通常相对开口。

生于海拔650~3 500 m的山谷湿岩石上。分布于西南及山西、湖南、陕西等地。

【采收加工】10~11月采收，晒干。

【药性】《贵州民间药物》：“性凉，味微涩。”

【功用主治】活血消肿，止血生肌。主治骨折，刀伤，疮疡溃烂，烧烫伤。

1. 《贵州民间药物》：“治刀伤，接骨。”

2. 《贵州草药》：“止血生肌。”

3. 《湖南药物志》：“消肿散血。主治小儿疳积，小儿惊风高热，疮疡溃烂，烫火伤。”

【用法用量】内服：煎汤，10~20 g。外用：捣敷。

【选方】1. 治刀伤骨折（变异铁角蕨）全草适量，嚼绒或捣绒敷伤处。（《贵州民间药物》）

2. 治烫火伤 变异铁角蕨叶、芭蕉叶（各适量），捣烂，调桐油敷患处。

3. 治小儿疳积（变异铁角蕨）全草15 g，煮蛋食。（2、3方出自《湖南药物志》）

## 0077 九管血 jiǔ guǎn xuě （《植物名实图考》）

【异名】八爪金龙、八爪龙、矮茎朱砂根、开喉箭、猪总管（南川《常用中草药手册》），团叶八爪金龙、矮陀陀、地柑子（《贵州草药》），散血丹（《广西药用植物名录》），血猴爪、鸟肉鸡、矮凉伞子、小罗伞、山豆根、活血脉（《新华本草纲要》）。

【基原】为紫金牛科紫金牛属植物九管血的全株或根。

【原植物】九管血 *Ardisia brevicaulis* Diels 又名：短茎紫金牛（《广西植物名录》），血党（《中国高等植物图鉴》）。

小灌木，高10~15 cm。具匍匐的根茎。叶互生；叶柄长1~1.5 cm，被细微柔毛；叶片坚纸质，狭卵形至近长圆形，先端急尖且钝，或渐尖，基部楔形或近圆形，长7~14 cm，宽2.5~4.8 cm，近全缘，边缘具不明显的腺点，背面被细微柔毛，尤以中脉为多，具疏腺点，侧脉与中脉几成直角，至近边缘上弯，连成远离边缘的不规则的边缘脉。伞形花序，着生于侧生特殊花枝顶端，近顶端有1~2片叶；花梗长1~1.5 cm；花的各部具腺点；花萼基部连合达1/3，萼片披针形或卵形；花瓣粉红色，卵形；雄蕊较花瓣短，花药披针形；雌蕊与花瓣等长，无毛。果球形，鲜红色，具腺点，宿存萼与果梗通常为紫红色。



九管血

花期6~7月，果期10~12月。

生于海拔400~1 260 m的林下阴处。分布于西南及长江流域以南各地。

【采收加工】6~7月采收，切碎，鲜用或晒干。

【药性】《四川常用中草药》：“性微寒，味苦、辛、微甘。”

【功用主治】清热解毒，祛风止痛，活血消肿。主治咽喉肿痛，风火牙痛，风湿痹痛，跌打损伤，无名肿毒，毒蛇咬伤。

1. 《植物名实图考》：“通窍，和血，祛风。”

2. 《贵州草药》：“清热，利咽，化瘀。”

3. 《四川常用中草药》：“除风湿，解热毒。治风湿筋骨疼痛，跌打损伤，劳伤咳嗽，喉头生蛾，无名肿毒，蛇咬伤等症。”

4. 《广西民族药简编》：“治胆道蛔虫症，肝炎，肝硬化，月经不调，咽喉肿痛。”

【用法用量】内服：煎汤，9~15 g；或浸酒。

【宜忌】孕妇慎服。

【选方】1. 防治白喉 鲜矮茎朱砂根60 g加水1 000 ml，小火煎2 h，滤去渣，分8份，每隔2 h服1份。（《中草药土方土法》）

2. 治跌打损伤 矮陀陀60 g，泡酒服。

3. 治风火牙痛 矮陀陀少许，切碎，放于牙痛处，口涎让其流出，随时更换。（2、3方出自《贵州草药》）

## 0078 九节菖蒲 jiǔ jié chāng pǔ （《中药志》）

【异名】小菖蒲、外菖蒲（《中药志》），节菖蒲（《中药材手册》），鸡爪莲（《陕西中药志》）。

【基原】为毛茛科银莲花属植物阿尔泰银莲花的根茎。


【原植物】阿尔泰银莲花 *Anemone altaica* Fisch. ex C. A. Mey. 又名：菊形双瓶梅（《中国植物图鉴》）。

多年生草本，高11~23 cm。根茎横生，圆柱形，长约4 cm，直径2~4 mm，节间长3~5 mm，有许多须根。叶柄长4~10 cm，无毛；三出复叶，叶片轮廓宽卵形，长2~4 cm，3全裂，中央全裂片又3裂，边缘有缺刻状牙齿，有细柄，侧生全裂片不等2全裂。花葶1，苞片3，轮生，叶状，中上部边缘有不整齐锯齿，具柄。花两性，单朵顶生；花梗长2.5~4 cm，被灰色柔毛；萼片7~10，花瓣状，白色，倒卵形或长圆形，长1.5~2 cm，宽3.5~7 mm，先端圆；花瓣无；雄蕊多数；心皮20~30。瘦果卵球形，有白色柔毛。花期3~5月，果期4~7月。

生于海拔1 200~1 800 m的山地沟谷边或灌木丛中。分布于山西南部、河南西部、湖北西北部、陕西南部。

【栽培】生物学特性 喜高山阴湿环境。荫蔽度为60%~70%。以疏松肥沃、土层深厚的腐殖质土栽植为宜。

繁殖方法 种子或根茎繁殖。种子繁殖：5~6月叶片枯黄时，收集成熟种子，湿沙贮存，7~9月将种子拌草木灰后，撒播畦面，覆土。幼苗于翌年3~4月出土，育苗1年，秋季



阿尔泰银莲花