

0181 大黄 dà huáng (《本经》)

【异名】 将军(李当之《药录》), 黄良、火参、肤如(《吴普本草》), 蜀大黄(《药性论》), 锦纹大黄(《千金方》), 牛舌大黄、锦纹(《纲目》), 生军(鲍相璈《验方新编》), 川军(《药物生产辨》)。

【基原】 为蓼科大黄属植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的根茎及根。

【原植物】 1. 掌叶大黄 *Rheum palmatum* L. 又名: 荞叶大黄、北大黄、天水大黄(《中药志》)。

多年生高大草本。根茎粗壮。茎直立, 高2 m左右, 中空, 光滑无毛。基生叶大, 有粗壮的肉质长柄, 约与叶片等长; 叶片宽心形或近圆形, 径达40 cm以上, 3~7掌状深裂, 每裂片常再羽状分裂, 上面疏生乳头状小突起, 下面有柔毛; 茎生叶较小, 有短柄; 托叶鞘筒状, 密生短柔毛。花序大圆锥状, 顶生; 花梗纤细, 中下部有关节, 花紫红色; 花被片6, 成二轮; 雄蕊9; 花柱3。瘦果有三棱, 沿棱生翅, 暗褐色。花期6~7月, 果期7~8月。

生于山地林缘或草坡, 野生或栽培。分布于四川西部、云南西北部、西藏东部、陕西、甘肃东南部、青海。

2. 唐古特大黄 *R. palmatum* L. var. *tanguticum* Maxim. ex Regel. [*R. tanguticum* Maxim. ex Balf.] 又名: 鸡爪大黄(《中药志》), 北大黄(《中药材品种论述》)。

本种与掌叶大黄极相似, 主要区别为: 叶片深裂, 裂片常呈三角状披针形或狭线形, 裂片窄长。花序分枝紧密, 向上直立, 紧贴于茎。

生于山地林缘较阴湿的地方。分布于四川及西藏东北部、甘肃、青海。



掌叶大黄



唐古特大黄

药用大黄

3. 药用大黄 *R. officinale* Baill. 又名: 南大黄、马蹄大黄(《中药志》), 雅黄(《中药材品种论述》)。

本种与上2种的主要不同点是: 基生叶5浅裂, 浅裂片呈大齿形或宽三角形; 托叶鞘膜质, 较透明, 上有短毛。花较大, 淡黄绿色, 花蕾椭圆形, 果枝开展, 翅果边缘不透明。

生于山地林缘或草坡。分布于河南西部、湖北西部、四川、贵州、云南、陕西南部等地。

【栽培】 生物学特性 喜冷凉气候, 耐寒, 忌高温。野生于我国西北及西南海拔2 000 m左右的高山区; 家种多在1 400 m以上的地区。冬季最低气温为-10℃以下, 夏季气温不超过30℃, 无霜期150~180 d, 年雨量为500~1 000 mm。对土壤要求较严, 一般以土层深厚, 富含腐殖质, 排水良好的壤土或砂质壤土最好, 黏重酸性土和低洼积水地区不宜栽种。忌连作, 需经4~5年后再种。

繁殖方法 种子繁殖, 也可用子芽(母株根茎上的芽)繁殖。种子繁殖: 大黄品种易杂交变异, 应选品种较纯的三年生植株作种株, 7月中、下旬待种子大部变黑褐色时, 连茎割回, 阴干, 脱粒。用育苗移栽、直播法两种。分春播和秋播, 一般以秋播为好。育苗, 可条播或撒播。条播: 横向开沟, 沟距25~30 cm, 播幅10 cm, 深3~5 cm。撒播: 将种子均匀撒在畦面, 薄覆细土, 盖草。发芽后于阴天或晴天午后将盖草揭去。苗出齐后, 及时除草、浇水。如幼苗太密, 可结合第一次除草间苗。苗期追施稀薄人畜粪尿2~3次。

初冬回苗后用土、草或落叶覆盖, 至次年萌芽时揭去覆盖物。春播者于第二年3~4月移栽, 秋播者于第二年9~10月移栽。选根有中指粗的幼苗, 将侧根及主根的细长部分剪去, 按行距70 cm, 株距50 cm开穴, 穴深30 cm左右, 每穴栽苗1株。春季移栽的盖土宜浅, 使苗叶露出地面, 以利生长; 秋季移栽盖土宜厚, 应高出芽嘴5~7 cm, 以免冬季遭受冻害。直播法, 按行距60~80 cm, 株距50~70 cm穴播, 穴深3 cm左右, 每穴播种5~6粒, 覆土2 cm左右。苗期管理与育苗移栽法相同。间苗1~2次, 在苗高10~15 cm时定苗, 每穴1株。子芽繁殖: 在收获大黄时, 将母株根茎上萌生的健壮而较大子芽摘下, 按行株距55 cm×55 cm挖穴, 每穴放1子芽, 芽眼向上, 覆土6~7 cm, 踏实。栽种时在切割伤口涂上草木灰, 以防腐烂。

田间管理 栽后第二年进行中耕除草3次。第三年在春、秋季各进行1次。第四年在春季进行1次。追肥在每次中耕除草后进行, 春夏季施油饼或人畜粪水, 秋季施土杂肥及炕土灰壅蔸防冻, 如堆肥中加入磷肥效果更好。大黄根茎肥大, 不断向上生长, 所以每次中除、追肥时, 都应培土, 以促进根茎生长, 又能防冻。大黄移栽后在第三、第四年的5~6月间, 抽薹开花, 除留种以外, 均应及时摘除花薹, 以免消耗大量养料, 以利根茎发育。

病虫害防治 病害有根腐病、轮纹病、疮痂病、炭疽病、霜霉病等, 可采用综合防治法, 实行轮作; 保持土壤排水良好; 及早拔除病株烧毁, 病株处的土壤用石灰消毒; 清除枯枝落叶及杂草, 消灭过冬病源; 发病前或发病时用1:1:120波尔多液喷雾或浇灌。虫害有金龟子和蚜虫, 可在早晨捕杀或夜晚点灯诱杀成虫。

【采收加工】 大黄移栽后, 一般于第三、第四年7月种子成熟后采挖, 先把地上部分割去, 挖开四周泥土, 把根从根茎上割下, 分别加工。北大黄挖起后不用水洗, 将外皮刮去, 大的开成对半, 小团型的修成蛋形。可自然阴干或用火熏干。南大黄先洗净根茎泥沙, 晒干, 刮去粗皮, 横切成7~