

3. 《药性论》：“味辛、咸。”
4. 《珍珠囊补遗药性赋》：“味辛，平。降也。阳中之阴也。”
5. 《雷公炮制药性解》：“入胃、大小肠三经。”
6. 《本草求真》：“入肝、脾。”
7. 《药性集要》：“辛咸兼苦味。”

【功用主治】 破瘀，消积，杀虫。主治妇女瘀血经闭，癥瘕，虫积。

1. 《本经》：“主绝伤，补中，续筋骨，填髓脑，安五脏，五缓六急，风寒湿痹。”

2. 《别录》：“疗咳嗽，消瘀血痞结腰痛，女子癥瘕，利小肠，去蛔虫。”

3. 《药性论》：“能杀三虫，主女人经脉不通。”

4. 《日华子》：“治传尸劳，除风。”

5. 《本草原始》：“妇人产后血运，多用干漆火烧熏鼻。”

【用法用量】 内服：入丸、散，2~4.5 g。外用：烧烟熏。

【宣忌】 内服宜炒或煅后用。孕妇及体虚无瘀滞者禁服。

1. 《本草经集注》：“畏鸡子，又忌油脂。”

2. 《日华子》：“入药须捣碎炒熟，不尔，损人肠胃。或毒发饮铁浆，并黄柏汁，及甘豆汤，吃蟹，并可制。”

3. 《经验方》：“怕漆人不可服。”（引自《政类本草》）

4. 《纲目》：“凡人畏漆者，嚼蜀椒涂口鼻可免。生漆疮者，紫苏汤、杉木汤、漆姑草汤、蟹汤浴之，皆良。”

5. 《本草从新》：“虚人及惯生大疮者戒之。”

6. 《得配本草》：“血枯经闭者，投之立毙。”

7. 《本草求真》：“无积血者切忌，以其伤营血，损胃气耳。”

8. 《本草求原》：“胃虚人忌之。”

【选方】 1. 治妇人脐下结物，大如杯升，月经不通，发作往来，下痢羸瘦，此为气瘕 末干漆一斤，生地黄三十斤（捣绞取汁）。火煎干漆，令可丸，食后服，如梧子大三丸，日三服。（《肘后方》）

2. 治产后恶露不下尽，腹内痛 干漆一两（捣碎，炒令烟尽），没药一两。上件药捣细罗为散，每服食前以热酒调下一钱。（《圣惠方》）

3. 治九种心痛，及腹胁积聚滞气 干漆（炒烟出）二两。上一味，捣罗为末，醋面糊丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，热酒下，醋汤亦得下，不拘时候。（《圣济总录》干漆丸）

4. 治小儿蛔虫咬心痛 干漆一两，捣碎，炒令烟出。捣细罗为散，每服以新汲水一合，生油一擦斗子，空心调下一字，不过三服，当取下虫。（《圣惠方》）

5. 治喉痹欲绝，不可针药者 干漆烧烟，以筒吸之。（《圣济总录》）

【各家论述】 1. 《纲目》：“（干）漆，性毒而杀虫，降而行血。所主诸证虽繁，其功只在二者而已。”

2. 《本草经疏》：“干漆，能杀虫消散，逐肠胃一切有形之积滞，肠胃既清，则五脏自安，瘀缓痹结自调矣。又损伤一证，专从血论，盖血者有形者也，形质受病，惟辛温散结而兼咸味者，可入血分而消之，瘀血消则绝伤自和，筋骨自续，而髓脑自足矣。其中痞结腰痛，女子癥瘕者，亦指下焦血分受寒，血凝所致。利小肠者，取其通行经脉之功耳。至于疗咳嗽，虽非正治，然亦有瘀血停积，发为骨蒸劳瘵，以致咳嗽者，得其消散瘀血之力，则骨蒸退而咳嗽亦除也。”

3. 《本经逢原》：“干漆灰，性善下降而破血，故消肿杀虫通月闭，皆取去恶血之用，而《本经》治绝伤补中，是取其破宿生新之力也。”“元素云，削年深坚结之积滞，破日久凝结

之瘀血，斯言尽干漆之用矣。无积血者切忌，以大伤营血，损胃气，故胃虚人服之，往往作呕，此与《本经》之义似乎相背，而实不相违。产后血晕，以旧漆器烧烟熏之即醒，盖亦取下血之义，而破经络中血滞。”

0134 干冬菜 gān dōng cài 《纲目拾遗》

【异名】 霉干菜（《纲目拾遗》），陈干菜（《本草再新》）。

【基原】 为十字花科芸苔属植物青菜 *Brassica chinensis* L. 的茎叶，经盐腌蒸晒而成。

【原植物】 参见“菘菜”条。

【药性】 《本草再新》：“味苦咸，性平，无毒。入肺、肾二经。”

【功用主治】 滋阴，开胃，化痰，利膈。主治肺热痰嗽，喉痛，失音。

1. 《纲目拾遗》：“开胃下气，益血生津，补虚劳，已痰嗽。年久者，泡汤饮，治声音不出。和酒捣烂，涂汤火伤。”

2. 《本草再新》：“治肺火咳嗽，化痰理气，治喉疼失音，益阴滋水。”

【选方】 治白火丹，此症形如水胀，肢体具肿，皮肤色白，饱胀不食，畏见灯火 冬菜（勿落水，愈陈愈妙），煎汤洗浴，并煎服之。（《纲目拾遗》）

0135 干地黄 gān dì huáng 《本经》

【异名】 生地黄（《本草图经》），原生地（《本草正义》），干生地（《中药志》）。

【基原】 为玄参科地黄属植物地黄 *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey. 的块根。

【原植物】 参见“鲜地黄”条。

【采收加工】 10~11月采挖鲜地黄后随即用无烟火烘炕，注意控制火力，要先大后小，炕时每日要翻动1~2次，当块根变软、外皮变硬、里面变黑即可取出，堆放1~2 d，使其回潮后，再炕至干即成。

【药材】 干地黄 *Radix Rehmanniae* 主产河南，以温县、博爱、孟县等地产量大，质亦佳。

性状 块根呈不规则团块状或长圆形，中间膨大，两端稍细，有的细小，长条状，稍扁而扭曲，长6~12 cm，直径3~6 cm。表面灰黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横皱纹。体重，质较软而韧，断面灰黑色、棕黑色或乌黑色，微有光泽，具黏性。气微，味微甜。

鉴别 (1) 粉末特征：深棕色。木栓细胞淡棕色，断面观类长方形，排列整齐。薄壁细胞类圆形，内含类圆形细胞核。分泌细胞形状与一般薄壁细胞相似，内含橙黄色或橙红色油滴状物。具缘纹孔及网状导管直径约至92 μm。

(2) 薄层色谱：取本品粉末2 g，加甲醇20 ml，加热回流1 h，放冷，滤过，滤液回收甲醇至5 ml作供试品溶液。另取梓醇对照品，加甲醇制成每1 ml含0.5 mg的溶液，作对照品溶液。分别点样于同一硅胶薄层板上，用氯仿-甲醇-水(14:6:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茴香醛试液，于105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱的相应位置上，显相同颜色的色斑。

品质标志 《中华人民共和国药典》2005年版规定：本品水溶性浸出物(冷浸法)不得少于65.0%。

【成分】 干地黄含环烯醚萜及其苷类：益母草苷(Leonuride)即是筋骨草醇(ajugol)，桃叶珊瑚苷(aucubin)，梓