

裂；腺体肾状，长圆形；雄花10~12，每朵具雄蕊1；雌花1，生于雄花中央，子房有短柄，花柱2裂。蒴果扁球形；种子靠顶部有偏向一侧的种阜。花期5~7月，果期7~9月。

生于海拔800~2800 m的山坡、山沟或灌丛、草地。分布于河南、湖北、湖南、四川、贵州等地。

本植物的茎叶(九牛造茎叶)亦供药用，另设专条。

【采收加工】 9~10月采挖，晒干。

【药材】 九牛造 *Radix Euphorbiae Hylonomae* 主产陕西、湖南、湖北、四川、贵州等地。

性状 根呈圆锥形，中段以下略有分枝，直径1.5~2 cm，表面黄褐色。断面黄色，有白乳汁外流。气微，味苦。

【药理】 抗癌作用 采用Brine Shrimp致死率生测法研究表明，其根提取物具抗癌活性^[1]。

【药性】 甘、苦，微温。有毒。

1. 《陕西中草药》：“味甘、苦，性温，有毒。”

2. 《四川常用中草药》：“性微温，味苦、辛。”

3. 《全国中草药汇编》：“甘、微苦，凉。”

【功用主治】 消积除胀，泻下逐水，破瘀定痛。主治食积鼓胀，二便不通，跌打损伤。

《陕西中草药》：“通便，利水，消积，破瘀，止痛。主治二便不通，积聚腹胀，胸膈不利，肝硬化腹水，急性肠炎，消化不良，劳伤，跌打损伤，瘀血作痛，无名肿毒。”

【用法用量】 内服：煎汤，1.5~3 g。外用：捣敷。

【宜忌】 反乌头、甘草。孕妇及体弱者禁服。

1. 《陕西中草药》：“反乌头和甘草，若服过量则上吐下泻，可用生姜汁或生姜煎汤解。”

2. 《全国中草药汇编》：“孕妇及体虚者忌服。”


0071 九龙藤 jiǔ lóng téng (《南宁市药物志》)

【异名】 过岗龙(《生草药性备要》)，过江龙(《岭南采药录》)，邬郎藤(《中国树木分类学》)，飞扬藤、山道藤、九龙根、羊蹄风(《广西药用植物名录》)，黄开口、子燕藤、五里藤、双木蟹(《浙江民间常用草药》)，马蹄叶根(《贵州草药》)。

【基原】 为豆科羊蹄甲属植物龙须藤的根或茎。

【原植物】 龙须藤 *Bauhinia championii* (Benth.) Benth. [*Phanera championii* Benth.; *B. hunanensis* Hand.-Mazz.; *B. championii* (Benth.) Benth. var. *acutifolia* L. Chen] 又名：田螺虎树(《植物名实图考》)。

木质藤本；有卷须。嫩枝和花序被紧贴的小柔毛。叶互生；叶柄长1~2.5 cm，纤细；叶片纸质，卵形或心形，长3~10 cm，宽2.5~6.5 cm，先端分裂锐渐尖，基部截形，微凹或心形；基出脉5~7条。花两性，总状花序狭长，腋生，有时与叶对生或数个聚生于枝顶而成复总状花序，长7~20 cm；花梗纤细；花托漏斗形；萼杯状，裂片5，披针形；花瓣5，白色，具瓣柄，瓣片匙形；能育雄蕊3，退化雄蕊2；子房具短柄，花柱短，柱头小。蒴果倒卵状长圆形或带状，扁平，长7~12 cm，宽2.5~3 cm，果瓣革质。种子2~5颗。花期6~10月，果



龙须藤

期7~12月。

生于低海拔至中海拔的丘陵灌木丛中、疏林或密林中。分布于浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、台湾等地。

本植物的叶(九龙藤叶)、种子(过江龙子)亦供药用，另设专条。

【采收加工】 7~11月采收，砍取茎干或挖出根部，切片，鲜用或晒干。

【药材】 九龙藤 *Radix seu Caulis Bauhiniae Championii* 主产广东。

性状 茎呈圆柱形，稍扭曲。表面粗糙，灰棕色或灰褐色，具不规则皱纹。质坚实，难折断，切断面皮部棕红色，木部浅棕色，有2~4圈深棕红色环纹，习称“鸡眼圈纹”，孔状导管细而密。气无，味微涩。

【药理】 促凝作用 龙须藤凝集素能使兔红细胞凝集^[1]。

【药性】 甘、微苦，温。

1. 《本草求原》：“甘、辛，微温。”

2. 《福建药物志》：“微苦、涩，温。”

【功用主治】 祛风除湿，行气活血。主治风湿痹痛，跌打损伤，偏瘫，胃脘痛，小儿疳积，痢疾。

1. 《生草药性备要》：“祛风湿，壮筋骨，理跌打伤，通行周身血府。又能行气，治痰火。”

2. 《本草求原》：“达气，通行血脉，祛风散湿，壮筋骨，理跌打。治内伤痰火，解郁积，除疳疗、内外痔。”

3. 《海南岛常用中草药手册》：“活血，祛风，补脾健胃。主治病后体虚，食欲不振，小儿疳积。”

4. 《福建药物志》：“治胃痛，痢疾。”

【用法用量】 内服：煎汤，9~15 g，鲜品用量加倍；或浸酒。

【宜忌】 《福建药物志》：“本品须切片久煎，用量不可超过30 g，过量服用有恶心反应。”

【选方】 1. 治风湿性关节痛、腰腿痛 龙须藤鲜根60~90 g，酒500 ml浸，每次服1杯，每日2次；或干根30 g水煎服。(《福建晋江《中草药手册》》)

2. 治跌打损伤 龙须藤干根、茎15~30 g，水煎调酒服。(《福建中草药》)

3. 治劳伤腰痛 马蹄叶根9 g，蒸猪腰子吃。(《贵州草药》)

4. 治偏瘫 (龙须藤)根30 g，黄酒、猪肉共煮熟，吃猪肉和汤。(《浙江民间常用草药》)

0072 九仙草 jiǔ xiān cǎo (《昆明民间常用草药》)

【异名】 九龙草、珍珠草、酒仙草、小星宿草(《昆明民间常用草药》)，山柏枝、绿珊瑚、撒花一颗针、一颗松(《云南中草药》)。

【基原】 为檀香科百蕊草属植物长叶百蕊草、露柱百蕊草的全草或根。

【原植物】 1. 长叶百蕊草 *Thesium longifolium* Turcz. 又名：茅草细辛、铁刷把(《西昌中草药》)。

多年生草本，高约50 cm，全株浅黄色。茎簇生，有明显的纵沟。叶无柄，线形，长4~4.5 cm，宽2.5 mm，两端渐尖，有3脉。总状花序腋生或顶生；花黄白色，钟状，长4~5 mm；苞片1枚，线形；小苞片2枚，狭披针形；花被5裂，裂片狭披针形，顶端锐尖，内弯；雄蕊5，插生于裂片基部；