

2. 《北方常用中草药手册》：“止血散瘀。治子宫功能性出血，宫颈癌及其他出血。”

3. 《陕甘宁青中草药选》：“治肾盂肾炎，尿血。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30 g。

【选方】 1. 治胃癌 二色补血草、薏苡仁、菱角各 30 g，水煎服。

2. 治月经不调 二色补血草 30 g。水煎服。（1、2 方出自《内蒙古中草药》）

3. 治子宫功能性出血，宫颈癌，肾盂肾炎，尿血 二色补血草 15~60 g，水煎服。（《陕宁青中草药选》）

【临床报道】 治疗多种出血证 用二色补血草根每剂 30 g，每日早晚 2 次水煎服；或用二色补血草片剂，每剂 3~4 片，每日 3 次，均连服 5 d 为 1 个疗程，对功能性子宫出血、月经过多、子宫肌瘤等在出血期间或下次月经来潮前 2~3 d 服用，重病患者可连服 2~3 个疗程。对食管、胃底静脉破裂出血或胃溃疡、胃癌出血采用二色补血草根提纯粉剂 3~5 g 冲服，或用汤剂胃管内注入。共治疗 206 例。结果：对功能性子宫出血、月经过多、子宫肌瘤、胃出血的有效率分别为 92.1%、95.6%、86.04%、90%^[1]。

0015 二歧银莲花根 èr qí yín lián huā gēn

【异名】 土黄芩（《吉林中草药》），草玉梅（《全国中草药汇编》）。

【基原】 为毛茛科银莲花属植物二歧银莲花的根茎。

【原植物】 二歧银莲花 *Anemone dichotoma* L.

多年生草本，高 35~60 cm。根茎横生，细长，暗褐色。茎直立，上部通常 2 叉状分枝。基生叶 1，早枯。花萼被贴伏的短柔毛；苞片 2，对生，轮廓扇形，长 3~6 cm，3 深裂近基部，深裂片近等长，长圆形或长圆状披针形，中部全缘，上部具少数缺刻状尖牙齿，下面被短柔毛。花序一至二回二歧状分枝，一回分枝长 9~14 cm，二回分枝长 1~10 cm，小苞片形状似苞片，较小；花两性，单生于花序分枝处；萼片 5，花瓣状，白色或带粉红色；花瓣无；雄蕊多数；心皮约 30。瘦果卵形。花期 6 月，果期 7~8 月。

生于丘陵、山坡湿草地或林下。分布于吉林、黑龙江。

【采收加工】 9~10 月采挖，晒干。

【成分】 根茎含皂苷^[1]。

全草含白头翁素（anemonin）^[1]。

【药性】 《全国中草药汇编》：“苦，凉。”

【功用主治】 舒筋活血，清热解毒。主治跌打损伤，风湿性关节炎，痢疾，疮痈。

1. 《吉林中草药》：“舒筋活血，强壮补虚。治跌打损伤、痢疾、疮痈。”

2. 《全国中草药汇编》：“解毒止痢。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~9 g。外用：捣敷。

【选方】 治跌打损伤 鲜土黄芩适量，捣烂，敷患处。（《吉林中草药》）

0016 十八症 shí bā zhèng

（广州部队《常用中草药手册》）

【异名】 歪叶子兰、小麻疙瘩（《云南中草药选》），石条花（《广西药用物名录》）。

【基原】 为胡椒科胡椒属植物光轴芸叶蒟的全株。

【原植物】 光轴芸叶蒟 *Piper boehmeriaefolium* (Miq.) C. DC. var. *tonkinense* C. DC.

直立亚灌木或有时呈攀缘状，高约 1 m。茎节膨大，绿色并有香辣味。叶互生；叶片薄纸质，有透明腺点，椭圆形、卵状长圆形或近卵形，长 10~16 (~20) cm，宽 4 (~10)~6 (~12) cm，先端渐尖，基部偏斜，两侧甚不等齐，一侧尖，一侧稍圆；侧脉每边 5~7 条，有两对脉离基发自中脉。花单性，雌雄异株，穗状花序与叶对生；雄花序长 10~15 (~22) cm，宽 2~3 mm，花序轴无毛；苞片圆形，具短柄，盾状，表面有腺点；雄蕊 2，花药肾形，2 室，花丝基部肥大；雌花序一般长 8~11 cm，结果时长达 16 cm；苞片与雄花序的相同；子房贴生于花序轴上，柱头顶生，4 裂。浆果密集，球形。花期 2~5 月。

生于海拔 500~1 900 m 的密林下、山谷中或林缘与溪旁。分布于广东、广西、海南、贵州、云南等地。

【采收加工】 7~9 月采收，切片，晒干。

【药材】 十八症 *Herba Piperis Tonkinensis* 产于广东、海南、广西、贵州、云南等地。


【性状】 茎蓝绿色，节膨大，有的有须根；断面中空。叶多卷缩，蓝绿色，完整叶卵圆形，长 8~15 cm，宽 3~5 cm，先端渐尖，基部歪斜，近全缘，可见透明腺点。有时带有穗状花序。气芳香，味辛、麻。

【鉴别】 取本品 5~10 g，加甲醇 70 ml，回流 10 min，滤过，取滤液 1 ml，加重氮化试剂 1~2 滴，显红色（检查酚类）。取本品 5 g，加甲醇 50 ml 回流提取 10 min，滤过，取滤液 1 ml，加镁粉少许及浓盐酸数滴，置水浴中加热数分钟，显红色（检查黄酮类）。

【成分】 地上部分含：谷甾醇（ β -sitosterol），4-烯-6 β -羟基-3-豆甾烷酮（stigmast-4-en-6 β -ol-3-one），麦角甾醇过氧化物（ergosterol peroxide）；生物碱：胡椒碱（piperine），胡椒次碱（piperidine），荜茇明宁碱（piperlonguminine），几内亚胡椒酰胺（guineensine），cephanone A、B；又含 α -棕榈酸甘油酯（ α -palmityl glycerin ester），(E)-3, 4-亚甲二氧基苯丙烯醛[(E)-3, 4-methylenedioxophenyl propenal]^[1]。

【药性】 广州部队《常用中草药手册》：“辛，温。”

【功用主治】 祛风散寒，活血调经，消肿止痛。主治风寒感冒，风湿痹痛，脘腹冷痛，牙痛，月经不调，痛经，跌打肿痛，蛇虫咬伤。



光轴芸叶蒟



二歧银莲花