

治感冒，眼结膜炎，肝炎，胃肠炎，痢疾，小儿疳积，毒蛇咬伤，跌打肿痛。”

5.《福建药物志》：“调气利湿，消肿解毒。主治黄疸，小便不利，淋浊，白带，乳腺炎，颈淋巴结炎。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30 g；或捣汁。外用：煎汤熏洗；或鲜草捣敷。

【选方】 1. 治风热感冒 丁癸草 15 g，柳叶菊 15 g，银花藤 30 g，水煎服。（《四川中药志》1979年版）

2. 治痔疮 丁癸草 120 g，银花 120 g，苦楝皮 120 g，以水煎出味，倒于浴盆内，趁热坐于盆上熏肛门，待水稍凉后，即坐于药水内浸洗，约浸 30 min 即可，每日 1~2 次。（《岭南草药志》）

3. 治毒蛇咬伤 鲜丁癸草捣烂取汁服，每次 20~30 ml，每日 3~4 次，渣敷伤口周围。（《广西本草选编》）

4. 治黄疸 丁癸草 60 g，车前草 30 g，水煎服。

5. 治急性胃肠炎 丁癸草 18 g，积雪草 15 g，白花蛇舌草 60 g。均用鲜全草捣烂绞汁，食盐少许冲开水，每 2 h 服 1 杯。（4、5 方出自《福建药物志》）

6. 治小儿疳疾 丁癸草 9~15 g，瘦猪肉 60~120 g，水炖服。（《福建中草药》）

0030 丁榔皮 dīng láng pí （《陕西中草药》）

【异名】 松杨木皮（《本草拾遗》）。

【基原】 为山茱萸科梾木属植物棕子木 *Swida macrophylla* (Wall.) Sojak 的树皮。

【原植物】 参见“棕子木”条。

【采收加工】 5~7 月剥取树皮，切段，晒干。

【药性】 苦，平。

【功用主治】 祛风通络，利湿止泻。主治筋骨疼痛，肢体瘫痪，痢疾，水泻腹痛。

1.《药性考》：“止痢寒热，水泻腹痛。”

2.《陕西中草药》：“祛风止痛，通经活络。主治筋骨疼痛，腰腿痛，肢体瘫痪。”

【用法用量】 内服：煎汤，6~15 g。

0031 丁香树皮 dīng xiāng shù pí （《海药本草》）

【异名】 丁皮（《纲目》），丁香皮（《本草求原》）。

【基原】 为桃金娘科丁子香属植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry] 的树皮。

【原植物】 参见“丁香”条。

【采收加工】 全年均可采，晒干。

【药性】 辛，温。归脾、胃经。

【功用主治】 散寒理气，止痛止泻。主治中寒脘腹痛胀，泄泻，齿痛。

1.《海药本草》：“治齿痛。”

2.《纲目》：“主治心腹冷气诸病，方家用代丁香。”

3.《本经逢原》：“治腹胀，恶心，泄泻虚滑，水谷不消。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~6 g；或入丸、散。外用：研末敷脐。

0032 丁香蓼根 dīng xiāng liǎo gēn （《湖南药物志》）

【基原】 为柳叶菜科丁香蓼属植物丁香蓼 *Ludwigia prostrata* Roxb. 的根。

【原植物】 参见“丁香蓼”条。

【采收加工】 秋季挖根，晒干或鲜用。

【药性】 苦，凉。

【功用主治】 清热利尿，消肿生肌。主治急性肾炎，刀伤。

【用法用量】 内服：煎汤，9~15 g。外用：捣敷。

【选方】 治急性肾炎 丁香蓼根、星宿菜各等量，每用 15 g，打入鸭蛋 1 个，拌匀，茶油炒食。（《湖南药物志》）

0033 丁癸草根 dīng guǐ cǎo gēn （《生草药性备要》）

【基原】 为豆科丁癸草属植物丁癸草 *Zornia gibbosa* Spanoghe 的根。

【原植物】 参见“丁癸草”条。

【采收加工】 9~11 月采挖，鲜用或晒干。

【药性】 甘，凉。

【功用主治】 清热解毒。主治痈疽，疔疮，脚气浮肿，瘰疬，蛇伤。

1.《生草药性备要》：“解热毒，散痈疽。治疗疮，亦治蛇伤。”

2.《本草求原》：“治牙痛，消蛇疮，理蛇伤，理疮口。”

3.《岭南采药录》：“治瘰疬。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30 g。外用：煅存性研末撒。

【选方】 1. 治脚气浮肿酸痛 鲜丁癸草根 45 g，猪蹄节 1 个，炖服，连服 3~5 次。（《泉州本草》）

2. 治瘰疬 丁癸草根 120 g，酒 240 g，同煎服。（《岭南采药录》）

3. 治蛇伤 鲜丁癸草根或全草，捣绞汁内服 1 小杯，渣敷患处，6 h 后再服再敷。（《泉州本草》）

0034 七叶莲 qī yè lián （广州部队《常用中草药手册》）

【异名】 小叶鸭脚木、汉桃叶（《广西中草药》），七叶烂（《贵州民间药物》），狗脚蹄（《台湾药用植物志》），手树、七加皮、七叶藤（《广西实用中草药新选》）。

【基原】 为五加科鹅掌柴属植物鹅掌藤的根或茎叶。

【原植物】 鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata

常绿藤状灌木，高 2~3 m。茎圆筒形，有细纵条纹。掌状复叶互生，有小叶 7~9 片；叶柄纤细，圆柱形，长 7~9 cm；托叶在叶柄基部与叶柄合生成鞘状，宿存或与叶柄一起脱落；小叶片革质，倒卵状长椭圆形，长 9~16 cm，宽 2.5~4 cm；先端渐尖或急尖，基部渐狭或钝形，全缘，上面绿色，光泽，下面淡绿色，网脉明显。伞形花序集成圆锥花序，顶生；总花梗短，花梗长 1.5~2.5 mm，均疏生星状绒毛，花萼 5 齿裂；花瓣 5~6 片，分离，卵形，白色；雄蕊 5；子房下位，5~6 室，柱头 5~6 枚，无花柱。浆果球形，有明显的五棱，橙黄色。花期 7~10 月。