

出自上年生叶腋基部，长达 12 cm，下垂；萼片 6，黄色；雄花有雄蕊 6 个，与花瓣对生；雌花有退化雄蕊 6 个，心皮多数，离生，螺旋排列，胚珠 1 粒。浆果肉质，具果柄，多数着生于一球形花托上。种子卵形，黑色，有光泽。花期 3~5 月，果熟期 8~10 月。

生于深山疏林、大山沟畔肥沃土壤的灌木丛中。分布于中南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南、陕西等地。

【采收加工】 8~9 月采收，切段，长 30~60 cm，或切片，晒干。

【药材】 大血藤 *Caulis Sargentodoxae* 主产于安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广西等地。

性状 茎呈圆柱形，略弯曲，长 30~60 cm，直径 1~3 cm。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩。

鉴别 茎横切面：木栓层为多列细胞，含棕红色物。皮层石细胞常数个成群，有的含草酸钙方晶。维管束外韧型。韧皮部分泌细胞常切向排列，与筛管群相间隔；有少数石细胞散在。束内形成层明显。木质部导管多单个散在，类圆形，直径约至 400 μm，周围有木纤维。射线宽广，外侧石细胞较多，有的含数个草酸钙方晶。髓部可见石细胞群。薄壁细胞含棕色或红棕色物。

【成分】 含有糖苷类：刺梨苷 (kajiiichigoside F₁)^[1]，胡萝卜苷 (daucosterol)^[2]，毛柳苷 (salidroside)，右旋丁香树脂酚二葡萄糖苷 (syringaresinol bisglucoside)^[3]，大血藤苷 (sargentcuneside)^[4]；蒽醌类：大黄素 (emodin)，大黄酚 (chrysophanol)^[5]，大黄素甲醚 (physcion)；酚酸类：右旋二氢愈创木脂酸 (dihydroguaiaretic acid)^[6]，香草酸 (vanillic acid)，原儿茶酸 (protocatechuic acid)^[5]。还含香豆酸对羟基苯乙醇酯 (*p*-hydroxyphenylethylcoumarate)^[5] 和红藤多糖^[7]。

【药理】 抑菌作用 用平碟法试验，25%煎剂对金黄色葡萄球菌、乙型链球菌有极敏感的抑制作用；对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、甲型链球菌、卡他球菌、白色葡萄球菌均有高敏感抑制作用^[1]。

【药性】 苦，平。归大肠、肝经。

1. 《浙江民间草药》：“性平，味酸、涩。”
2. 《四川中药志》1960 年版：“性凉，味苦，无毒。入肝、大肠二经。”
3. 《陕西中草药》：“味苦，性平。”
4. 《全国中草药汇编》：“苦、涩，平。”

【功用主治】 解毒消痛，活血止痛，祛风除湿，杀虫。主治肠痈，痢疾，乳痈，痛经，经闭，跌打损伤，风湿痹痛，虫积腹痛。

1. 《简易草药》：“治筋骨疼痛，追风，健腰膝，壮阳事。”
2. 《草木便方》：“大血藤温入血分，疗扑损伤积血病，破瘀生新止瘀血，膨胀鼻衄金疮病。”
3. 《草药新纂》：“作收敛药。治妇人月经过多及痛经，疗血痢、肠痈。”
4. 《四川中药志》1960 年版：“能行血破滞，调气行瘀。治

跌打损伤，疮疡肿痛等症。”

5. 《湖南药物志》：“通经补血，强筋壮骨，驱虫。”“治跌打损伤，风湿疼痛，血晕，血淋，疮疖，阑尾炎，血丝虫病。”

6. 《闽东本草》：“治心腹绞痛，赤白痢疾，经闭。”

7. 广州部队《常用中草药手册》：“治肢节酸痛，麻木拘挛，水肿，血虚头昏。”

8. 《陕西中草药》：“抗菌消炎，消肿散结，理气活血，祛风，杀虫。主治阑尾炎，跌打损伤，风湿疼痛，月经不调，崩漏，小儿疳积，蛔虫、蛲虫症。”

【用法用量】 内服：煎汤，9~15 g；或酒煮、浸酒。外用：捣烂敷患处。

【宜忌】 孕妇慎服。

《闽东本草》：“孕妇不宜多服。”

【选方】 1. 治灼伤 大血藤、金樱子根各 500 g。以水煎成 500 ml。对已发生感染的创面可行湿敷，能促使创面清洁，加速愈合。〔遵义医学院附院《新医药资料》1971, (11):2〕

2. 治痛经 红藤、益母草、龙芽草各 9~15 g。水煎服。〔《浙江药用植物志》〕

3. 治血崩 红藤、仙鹤草、茅根各 15 g。水煎服。〔《湖南药物志》〕

4. 治跌打损伤 大血藤、骨碎补各适量。共捣烂，敷伤处。〔《湖南农村常用中草药手册》〕

5. 治风湿性关节炎 红藤 30 g，五加皮、威灵仙藤叶各 15 g。水煎服。〔《浙江药用植物志》〕

6. 治小儿疳积，蛔虫或蛲虫症 红藤 15 g，或配红石耳 15 g，共研细末，拌红白糖食。〔《陕西中草药》〕

【临床报道】 1. 治疗瘤型麻风结节反应 红藤 500 g，研粉，制成丸剂，日服 2 次，每次 9 g；或用红藤根 500 g，切片，以白酒 5000 g 浸泡 10~20 d，每次服 10~20 ml，每日 3 次。分别治疗瘤型麻风结节反应 18 例和 38 例，服药后症状均减轻而渐消失^[1]。

2. 治疗早期急性乳腺炎 大血藤 60 g（病重者用 90 g），水煎分 2 次口服。共治疗 24 例，结果治愈 21 例（其中 2~4 d 痊愈者 18 例，4~6 d 痊愈者 3 例），好转 2 例，无效 1 例。本组有 9 例曾先用抗生素治疗，因疗效不显转服中药，其余病例未用过其他药物和疗法^[2]。

0197 大红袍 (《贵州民间药物》)

【异名】 簕蕷子 (《植物名实图考》)，矮零子、豆瓣柴、铁打杵 (《贵州民间药物》)，碎米果、牙痛草、碎米颗 (《云南中草药》)，碎米柴 (《贵州中草药名录》)。

【基原】 为紫金牛科铁仔属植物铁仔的根或枝叶。

【原植物】 铁仔 *Myrsinus africana* L.

灌木，高 0.5~1 m。小枝圆柱形，幼嫩时被锈色微柔毛。叶互生；叶柄极短，下延至小枝上；叶片革质或坚纸质，



铁仔