

【成分】 本品含没食子酸(gallic acid)和诃子次酸三乙酯(triethylchebulate)^[1]。

【药理】 抑菌作用 丁香蓼水提取物去除鞣质后分离得到没食子酸和诃子次酸三乙酯，体外抗菌试验证实对宋内、舒氏、鲍氏、志贺等痢疾杆菌及金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等有较好的抑菌作用^[1]。

【药性】 苦，寒。

1. 《福建民间草药》：“甘，平。”
2. 《福建中草药》：“微苦、辛，凉。”
3. 《贵州草药》：“性寒，味苦。”

【功用主治】 清热解毒，利尿通淋，化瘀止血。主治肺热咳嗽，咽喉肿痛，目赤肿痛，湿热泻痢，黄疸，淋证，水肿，带下，吐血，尿血，便血，疔肿，疥疮，跌打伤肿，外伤出血，蛇虫、狂犬咬伤。

1. 《中国药用植物志》：“治红白痢疾。”
2. 《福建民间草药》：“利尿消胀。治水肿，小便淋沥。”
3. 《四川中药志》1960年版：“破血生新。治吐血，黄疸，小儿积水及火疗。”
4. 《湖南药物志》：“治目翳，蛇虫咬伤，外伤出血。”
5. 《福建中草药》：“治湿热腹泻。”
6. 《贵州草药》：“清热止咳。治火咳。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~30 g；或泡酒。外用：捣敷。

【选方】 1. 治火咳 银仙草 12 g，水白菊花 9 g，煨水服。（《贵州草药》）

2. 治急性喉炎 鲜丁香蓼 60 g，水煎后取汤分2份，1份调冰糖服，1份调醋含漱。（《福建药物志》）

3. 治小便淋沥（丁香蓼）全草 30 g，车前草 15 g。冲开水炖 1 h，饭前服。日 2 次。（《福建民间草药》）

4. 治水肿（丁香蓼）全草 30 g。酌加水煎，加些冰糖，饭前服，日 2 次。（《福建民间草药》）

5. 治妇女带下赤白，或色黄秽臭，头晕目眩，肢软足酸 鲜丁香蓼全草 45 g，白鸡冠花 30 g，加水 2 碗半，煎成 1 碗，去渣取汁和小肚炖服。服药期间，勿食富含蛋白质食物，如豆干、豆腐、鸡蛋、鸭蛋等；禁食辛酸物，如辣椒、酒、醋等。（《泉州本草》）

6. 治跌打损伤出血 丁香蓼 30 g，苏木 15 g，桃仁 6 g，红花 6 g，黄酒 125 g，水煎前 4 药，冲黄酒服。另用鲜丁香蓼叶捣烂敷患处。（《河南中草药手册》）

7. 治狂犬咬伤 鲜丁香蓼 500 g，捣烂加酒 60 ml，绞汁，服至呕吐为止。将渣调红糖和豆腐敷伤部。（《福建药物志》）

【临床报道】 治疗顽固性湿疹 用新鲜丁香蓼全草 200 g，水 3 000 ml 煎煮 20 min 后倒入盆中熏蒸患处，上覆盖毛巾，随温度调节距离，避免烫伤，待水温降至不烫手时再充分浸洗患部，约半小时，每日 2 次，病情特别顽固的可熏洗 3~4 次，一直熏洗到痊愈为止。共治疗 10 例。结果：治疗 3 d 后痊愈 3 例，5 d 后痊愈 2 例，7 d 后痊愈 4 例，10 d 后痊愈 1 例^[1]。

0028 丁香露 dīng xiāng lù (《纲目拾遗》)

【基原】 为桃金娘科丁子香属植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry] 干燥花蕾的蒸馏液。

【原植物】 参见“丁香”条。

【药性】 微辛，微温。

1. 《纲目拾遗》：“气烈，味微辛。”
2. 《药性考》：“辛，微温。”

【功能与主治】 《纲目拾遗》：“治寒滞胃痛。”

【用法用量】 内服：隔水炖温饮，30~60 g。

0029 丁癸草 dīng guǐ cǎo (《生草药性备要》)

【异名】 人字草、苦地枕、铺地锦（《岭南采药录》），乌蝇翼草（《中国主要植物图说》），铺地草、金线吊虾蟆（《广西中草药》），乌龙草、红骨丁地青（《实用中草药》），斜对叶（《广西药用植物名录》）。

【基原】 为豆科丁癸草属植物丁癸草的全草。

【原植物】 丁癸草 *Zornia gibbosa* Spanoghe

多年生小草本，高 15~60 cm。茎纤细，分枝，披散或直立。小叶 2 枚，生于叶轴顶端，叶片披针形，长 2~3.5 cm，宽 0.5~1 cm，先端急尖，基部圆形，厚纸质。总状花序腋生，长 2~6 cm；苞片 2，盾状着生，革质，卵形，基部延伸成距，有明显脉纹，边缘有白色缘毛；花萼钟状，二唇形，有短柔毛；花冠黄色，极突出，旗瓣圆形，翼瓣倒卵形或长圆形，龙骨瓣内弯，短尖；雄蕊 10，一体，花药二型；子房上位，无柄，花柱线形。荚果不开裂，由 2~6 荚节组成，荚节圆形，有明显的细脉及刺。花期 6~8 月。



丁癸草

生于少干旱的山野地上。分布于浙江、福建、江西、广东、广西、四川、云南、台湾等地。

本植物的根（丁癸草根）亦供药用，另设专条。

【采收加工】 5~7 月采收，鲜用或晒干。

【药材】 丁癸草 *Herba Zorniae Gibbosae* 主产于广东、广西、福建、四川、浙江等地。

性状 全草长 20~40 cm。根及根茎长圆锥形，黄色或灰黄色，直径约 2 mm。茎纤细，黄绿色或灰绿色，无毛。小叶 2，生于叶柄顶端，呈“人”字形；托叶细，卵状披针形。小叶多皱缩卷曲，完整者展平后呈长椭圆形或披针形，灰绿色或灰白色，先端处具一细尖刺，全缘，下面疏被茸毛或无毛，在放大镜下可见黑色腺点。气微，味淡。

【成分】 全草含香豆素(coumarin)^[1]。

【药性】 苦、甘，凉。

1. 《生草药性备要》：“味甜，性温。”
2. 《岭南草药志》：“味苦、甘，性寒。”
3. 《广东中药》：“平淡，性凉。”

【功用主治】 清热解毒，凉血散瘀，除湿利尿。主治风热感冒，咽痛，疮疡肿毒，毒蛇咬伤，黄疸，泄泻，痢疾，小儿疳积。

1. 《本草求原》：“消大疮。”

2. 《岭南采药录》：“生肌，合诸疮口。”

3. 《岭南草药志》：“去痰火，清肝热，消瘀，凉血，解毒。”

4. 广州部队《常用中草药手册》：“清热解表，去瘀消肿。”