

Perry]的干燥花蕾经蒸馏所得的挥发油,古代多为母丁香所榨出之油。

【原植物】 参见“丁香”条。

【药材】 丁香油 *Oleum Syzygii Aromatici* 产于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚。多进口。

性状 本品为淡黄或无色的澄明油状体,有丁香的特殊芳香气。露置空气中或贮存日久,则渐浓厚而色变棕黄。不溶于水,易溶于醇、醚或冰醋酸中。相对密度为 1.038~1.060。

【药理】 1. 抗菌作用 丁香油树脂对食品常见污染菌金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草芽胞杆菌、汉逊酵母、黑曲霉、青霉等有很强的抑制作用^[1]。对真菌也有一定拮抗作用^[2]。

2. 其他作用 促进裸鼠 5-氟尿嘧啶的透皮吸收^[3],对氧自由基有清除作用^[4]。

【药性】 《纲目拾遗》:“气味甘、辛,性大热。”

【功用主治】 暖胃,降逆,温肾,止痛。主治胃寒胀痛,呃逆,吐泻,疝痛,痹痛,牙痛,口臭。

1. 《药性考》:“壮阳暖肾,治疝痛阴寒。”

2. 王殿翔《生药学》:“用于肠胃多气,绞痛,消化不良,恶心与呕吐;风湿痛,神经痛,牙痛。”

【用法用量】 内服:以少许滴入汤剂中或和酒饮。外用:涂擦患处。

【宜忌】 实火、阴虚火旺者禁服。

【选方】 1. 治胃寒痛 滴少许丁香油入煎药,或和好酒服,或以丁香油涂脐上痛处。《纲目拾遗》

2. 治胃寒呃逆呕吐甚者 用丁香油擦透中脘。《纲目拾遗》引金御乘方)

3. 暖丹田,除水泻 丁香油涂暖脐膏贴。

4. 散疝痞 丁香油涂脐。(3、4方出自《纲目拾遗》)

5. 治痛痹 丁香油擦痛处。《纲目拾遗》引金御乘方)

6. 治口臭 丁香油揩牙。

7. 解蟹毒 丁香油一滴,同姜汤服。(6、7方出自《纲目拾遗》)

【临床报道】 1. 治口腔溃疡 治疗组 36 例,用适量蒙脱石加丁香油搅拌成糊状,涂于患处,每日 4~6 次。对照组 35 例,用适量冰硼散或碘甘油局部涂抹,每日 4~6 次。全部病例均口服维生素 B₂。结果治疗组显效 13 例,有效 16 例,总有效率为 80.56%。对照组显效 6 例,有效 12 例,总有效率为 51.43%。两组疗效差异显著^[1]。

2. 治干槽症 先清除坏死腐败组织,再用 3% 过氧化氢溶液及生理盐水清洗患处,然后置丁香油棉球于拔牙创内,每日换药 1 次。共治疗 230 例。结果所有患者治疗当日可明显减轻疼痛,3 d 后主诉无明显疼痛者 219 例(占 95%),治疗后检查拔牙创骨壁无明显触痛,无腐败物覆盖及臭味,余 11 例 1 星期后均治愈^[2]。

3. 致口腔黏膜过敏 多因牙病局部用丁香油棉球或氧化锌丁香油粘固粉后出现口腔黏膜烧灼感,牙龈胀痛,黏膜充血,水肿,或出现水泡等。做丁香油斑贴试验为阳性^[3,4]。

【各家论述】 1. 《纲目拾遗》引《祝穆试效方》:“丁香油治瘰疬,化核膏用之,取其香烈直透经络,辛以散结滞耳。”

2. 《纲目拾遗》:“丁香油,透关窍,祛寒,力速于丁香。”

0026 丁香根 *dīng xiāng gēn* (《开宝本草》)

【基原】 为桃金娘科丁子香属植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et

Perry]的树根。

【原植物】 参见“丁香”条。

【采收加工】 9~11 月挖根,切片,晒干。

【药性】 《纲目》:“辛,热。有毒。”

【功用主治】 散热拔毒。主治肿毒。

1. 《开宝本草》:“疗风热毒肿。”

2. 《药性考》:“治肿毒内陷。”

【用法用量】 外用:捣敷或煎汤洗。

0027 丁香蓼 *dīng xiāng liǎo* (《中国药用植物志》)

【异名】 丁子蓼、红豇豆、喇叭草(《中国药用植物志》),水杨柳(《四川中药志》),田蓼草、红麻草(《湖南药物志》),银仙草(《贵州草药》),田痞草(《广西药用植物名录》),水蓬砂(《贵州植物药调查》),水硼砂(《贵州中草药名录》)。

【基原】 为柳叶菜科丁香蓼属植物丁香蓼的全草。

【原植物】 丁香蓼 *Ludwigia prostrata* Roxb.

一年生草本,高 40~60 cm。须根多数;幼苗平卧地上,或作倾卧状,后抽茎直立或下部斜升,多分枝,有纵棱,略红紫色。叶互生;叶片披针形或长圆状披针形,长 2~8 cm,宽 1~2 cm,全缘,上面有紫红色斑点。花两性,单生于叶腋,黄色,基部有小苞片 2;萼筒与子房合生,萼片 4,卵状披针形;花瓣 4;雄蕊 4;子房下位,花柱短,柱头头状。蒴果线状四方形,略具 4 棱,稍带紫色,成熟后室背不规则开裂;种子多数,细小,光滑,棕黄色。花期 7~8 月,果期 9~10 月。



丁香蓼

生于田间、水边、沟畔湿处及沼泽地。分布于江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、台湾等地。

本植物的根(丁香蓼根)亦供药用,另设专条。

【采收加工】 9~11 月结果时采收,切段,鲜用或晒干。

【药材】 丁香蓼 *Herba Ludwigiae Prostratae* 产于湖南、四川、湖北、安徽、江苏、浙江、江西、福建、贵州等地。

性状 全株较光滑。主根长圆锥形,多分枝。茎下部节上多须状根;上部多分枝,有棱角约 5 条,暗紫色或棕绿色,易折断,断面灰白色,中空。单叶互生,多皱缩,完整者展平后呈披针形,全缘,先端渐尖,基部渐狭,长 4~7 cm,宽 1~2 cm。花 1~2 朵,腋生,无梗。花萼、花瓣均 4 裂,萼宿存,花瓣椭圆形,先端钝圆。蒴果条状四棱形,直立或弯曲,紫红色,先端具宿萼。种子细小,光滑,棕黄色。气微,味咸,微苦。

鉴别 (1) 叶横切面:上、下表皮均为 1 列类长方形细胞组成,外被非腺毛及腺鳞。栅栏组织不通过中脉,海绵组织排列疏松。主脉维管束外韧型,韧皮部窄;木质部导管呈放射状排列。主脉上、下表皮内侧有数列厚角细胞,薄壁细胞含草酸钙针晶、簇晶。

(2) 取本品粉末 1 g,加乙醇 15 ml,回流 30 min,冷却,滤过。取滤液少许,滴于滤纸上,喷以 0.1% 溴酚蓝的乙醇溶液,在蓝色背景上显黄色斑点(检查有机酸)。取滤液 1 ml,滴加 1% 三氯化铁溶液 1 滴,显蓝黑色(检查没食子酸)。