

醇(ceryl alcohol),谷甾醇(sitosterol)^[14]。

2. 粗叶拉拉藤 地上部分含车叶草苷,维生素(vitamin) C^[15]。

根含蒽醌类色素成分:4-甲氧基-1-萘酚(4-methoxy-1-naphthol),1-萘酚异戊醚(1-naphthol isopentylether),1-萘酚异戊烯醚(1-naphthol isopentenyl ether),2,2-二甲基萘酚[1,2-b]吡喃[2,2-dimethylnaphthol[1,2-b]pyran],3,4-二氢-2,2-二甲基萘酚[1,2-b]吡喃[3,4-dihydro-2,2-dimethylnaphthol[1,2-b]pyran]^[16]。

【药理】1. 抑菌作用 猪殃殃 100%煎剂用平板纸片法,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺痢疾杆菌等有抑制作用^[1]。

2. 抗癌作用 醇浸膏每日以 2.2 g/kg,口服或腹腔注射连续 6 d,对小鼠白血病 L₆₁₅ 有抑制作用,抑制率为 28.5%^[1]。5 g(生药)/ml 在美蓝试管法筛选试验中,对急性淋巴细胞型白血病及急性粒细胞型白血病均为阳性^[2]。

3. 其他作用 猪殃殃中的车叶草苷对家兔有降低血压作用^[3]。

【药性】 辛、微苦,微寒。

1. 《滇南本草》:“味辛、苦,性微寒。入少阳、太阴二经。”

2. 《广西中药志》:“味涩,性平。”

3. 《湖南药物志》:“甘、涩,微寒。”

【功用主治】 清热解毒,利尿通淋,消肿止痛。主治痈疽肿毒,乳腺炎,阑尾炎,水肿,感冒发热,痢疾,尿路感染,尿血,牙龈出血,刀伤出血。

1. 《滇南本草》:“治脾家湿热,诸经客热,诸癆症,虚热,烦热,筋骨疼痛。走小肠经,治五种热淋,小便赤白浊,玉茎疼痛。”

2. 《贵州草药》:“利湿祛瘀,止血。治中耳炎,刀伤出血,热淋,小便赤涩,骨折,久咳,小儿白口疮等。”

3. 《云南中草药》:“清热凉血,利尿。治血淋,尿路感染,中耳炎。”

4. 《湖南药物志》:“清热解毒,消肿止痛。治痈疽肿毒,妇女闭经,创伤肿胀。”

5. 《安徽中草药》:“活血通络,抗癌。治子宫癌,慢性白血病,菌痢。”

【用法用量】 内服:煎汤,15~30 g;或捣汁饮。外用:捣敷。

【选方】 1. 治急性阑尾炎 猪殃殃 90 g,鬼针草 30 g,草红藤 30 g,水煎服。

2. 治乳腺炎初起 鲜猪殃殃 120 g,水煎服;或鲜品适量,捣烂外敷。(1、2方出自《四川中药志》1979年版)

3. 治感冒 鲜猪殃殃 30 g,姜 3 片,捣汁冲开水服。(江西《草药手册》)

4. 治热证出血 猪殃殃 30 g,地榆 12 g,小蓟 12 g,水煎服。(《四川中药志》1979年版)

5. 治细菌性痢疾 猪殃殃 15~60 g,水煎服。(《安徽中草药》)

6. 治跌打损伤 鲜猪殃殃根、马兰根各 12 g,水酒各半煎服。另以鲜猪殃殃全草、酢浆草等分捣烂外敷。(江西《草药手册》)

7. 治子宫癌,乳腺癌,甲状腺肿瘤 猪殃殃 30 g,水煎,加红糖适量冲服。或鲜品 250 g,洗净绞汁加红糖服,每日 3~5 次分服。(《四川中药志》1979年版)

8. 治妇女经闭 猪殃殃 6 g,水煎服。(《湖南药物志》)

【临床报道】 1. 治疗菌痢 拉拉藤干品 15~60 g,水煎分 2 次服;或制片,每片 0.3 g,每次 10 片,每日 4 次;或用

浸膏片,每片 0.3 g,每日 4 次,每次 4 片。共治疗 72 例,结果:治愈 69 例,好转 2 例,无效 1 例,平均住院 9.23 d^[1]。

2. 治疗肿瘤 新鲜拉拉藤 250 g 绞汁,加红糖适量冲服,每日 1 剂;或用干品,水煎 30~60 min,加红糖适量,每日 1 剂;或以干品洗净切碎,放铁锅中烙片刻取出,每日 30 g,开水冲泡,分次频服。治疗乳腺癌、食管癌、下颌腺癌、宫颈癌共 9 例,其中临床痊愈 1 例,显效 3 例,有效 2 例,无效 3 例;治疗良性肿瘤 6 例,其中显效 2 例,有效 4 例。疗程最短 1 月多,最长 2 年。长期服用无明显毒副作用,仅部分患者有头昏、恶心等,但加红糖同用可减轻反应,配入补益方中反应可基本消失^[2]。

3. 治疗慢性肾功能衰竭 用仙草汤(八仙草 60 g,薏苡仁 15 g,制大黄 10 g)水煎服,每次 80 ml,每日 2 次,1 月为 1 个疗程。共治疗 30 例。结果:显效 20 例,有效 9 例,无效 1 例,总有效率 96.67%。其中第 I、第 II 期者效果最好,有效率达 100%。实验室检查结果显示:本方能明显降低患者血中尿素氮、肌酐含量,降低尿蛋白,能消除或减轻水肿,改善患者临床症状^[3]。

0043 八角香 bā jiǎo xiāng (《贵州民间药物》)

【异名】 蜘蛛草(《贵州民间药物》),羊角天麻(四川)。

【基原】 为菊科蟹甲草属植物白花蟹甲草的块茎。

【原植物】 白花蟹甲草 *Cacalia ainsliaeflora* (Franch.) Hand.-Mazz. [*Senecio ainsliaeflorus* Franch.] 又名:兔耳风花蟹甲草(《万县中草药》)。

多年生草本,高 60~100 cm。根茎粗壮。茎上部和花序有褐色短柔毛。叶互生;叶柄长 5~8 cm;叶片圆形或肾形,有 5~7 个三角形裂片,基部宽心形或截形,下面沿叶脉上有短柔毛,叶长和宽 8~12 cm,上部叶较小,下部叶花期凋落。头状花序极多,在顶端或上部叶腋排成总状或复总状,花序分枝开展;花序轴和总花梗有褐色密短毛;总苞圆柱形;总苞片 5;花 5 个,筒状,白色。瘦果圆柱形。



白花蟹甲草

生于林缘或草地。分布于湖北、湖南、四川、贵州等地。

【采收加工】 9~11 月采挖,鲜用或切片晒干。

【成分】 含佛术烷型倍半萜:3 β -当归酰氧基-8 α -羟基-6 β -甲氧基佛术-7(11), 9(10)-二烯-8, 12-内酯[3 β -angeloyloxy-8 α -hydroxy-6 β -methoxyeremophil-7(11), 9(10)-dien-8, 12-olide], 3 β -当归酰氧基-6 β , 8 α -二羟基佛术-7(11), 9(10)-二烯-8, 12-内酯[3 β -angeloyloxy-6 β , 8 α -dihydroxyeremophil-7(11), 9(10)-dien-8, 12-olide], 3 β -当归酰氧基-8 α -羟基-6 β -乙氧基佛术-7(11), 9(10)-二烯-8, 12-内酯[3 β -angeloyloxy-8 α -hydroxy-6 β -ethoxyeremophil-7(11), 9(10)-dien-8, 12-olide]和 3, 8-氧-佛术-6, 9-二烯-12-酸(3, 8-oxo-eremophila-6, 9-dien-12-oic acid);倍半萜:3 β -当归酰氧基-8-氧代-佛术-6, 9-二烯-12-烯酸(3 β -angeloyloxy-8-oxo-eremophila-6, 9-dien-12-oic acid)^[1]。