

【习用名称】 仙遗粮、冷饭团、奇粮。

【炮制】 鲜土茯苓 用时将原药除去杂质，洗净，切片。

土茯苓 已切片者将原药除去杂质，筛去灰屑；未切片者将原药洗净，浸、润至软，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 鲜土茯苓 本品略呈圆柱形或不规则条块状，稍扁，有结节状隆起，具短微分枝；长5~22cm，直径2~5cm，表面灰褐色或黄棕色，粗糙，凹凸不平，外皮有不规则裂纹、突起的尖端及坚硬的须根残基。切面淡红色至淡红棕色，散有深色筋脉点，置阳光下观察，可见细小亮晶状物。质坚韧，难折断。气微，味微甘、涩。

土茯苓 本品为类圆形或不规则的切片，厚1~5mm，直径2~5cm。边缘不整齐。表面黄棕色至棕褐色，有的可见坚硬的残留须根。切面类白色至淡红棕色，可见点状维管束及多数小亮点。质略韧，粉性，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有黏滑感。气微，味微甘、涩。

【鉴别】 本品粉末淡棕色。淀粉粒甚多，单粒类球形、多角形或类方形，直径8~48 μm ，脐点裂缝状、星状、三叉状或点状，大粒可见层纹；复粒由2~4分粒组成。草酸钙针晶束存在于黏液细胞中或散在，针晶长40~144 μm ，直径约5 μm 。石细胞类椭圆形、类方形或三角形，直径25~128 μm ，孔沟细密；另有深棕色石细胞，长条形，直径约50 μm ，壁三面极厚，一面菲薄。纤维成束或散在，直径22~67 μm 。具缘纹孔导管及管胞多见，具缘纹孔大多横向延长。

【检查】 土茯苓 杂质 不得过2%（《中国药典》2005年版一部附录IX A）。

总灰分 不得过5.0%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

酸不溶性灰分 不得过1.0%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

【浸出物】 土茯苓 照浸出物测定法项下的热

浸法（《中国药典》2005年版一部附录X A）测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于14.0%。

【性味与归经】 甘、淡、平。归肝、胃经。

【功能与主治】 除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛。

【用法与用量】 15~60g；鲜品30~60g，随用随取。

【注意】 服药时不宜饮茶。

【贮藏】 置干燥处；鲜品埋在沙土内，防腐。

大 黄

Dahuang

本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Regel 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 除去外皮的干燥根及根茎。

【习用名称】 锦纹、川军。

【处方应配】 写大黄付生大黄、写制军、制大黄均付酒制大黄、写酒军、酒大黄均付酒洗大黄。

【炮制】 生大黄 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

酒制大黄 取生大黄，照酒蒸法（附录I）蒸至内外均呈黑色，再将蒸时所得汁水拌入，使之吸尽，干燥，筛去灰屑。

每生大黄100kg，用黄酒20kg。

酒洗大黄 将生大黄喷洒黄酒，拌匀，使之吸尽，干燥。

每生大黄100kg，用黄酒13kg。

【性状】 生大黄 本品为类圆形、半圆形或不规则形的切片，边缘有的具凹陷与缺刻，直径2.5~10cm。表面黄棕色至红棕色，可见类白色网状纹理，残留的外皮棕褐色。切面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在（异型维管束）；根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，