【功能与主治】 益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。

【用法与用量】 6～30g。

【贮藏】 置干燥处，防潮，防蛀。

巴 戟 天

Bajitian

本品为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。

【习用名称】 巴戟肉。

【炮制】 将原药除去杂质,洗净,置蒸具内蒸热，除去木心,切短段,干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈扁圆形或圆柱形不规则的段状，直径 0.5～2cm。表皮灰褐色至黑褐色，具纵皱纹及横皱纹，有的可见横裂纹。切面淡紫色至黑褐色。质坚。气微，味微甜，略带涩。

【鉴别】 (1)本品横切面：木栓层为数列细胞。皮层外侧石细胞单个或数个成群，断续排列成环；薄壁细胞含有草酸钙针晶束，切向排列。韧皮部宽广，内侧薄壁细胞含草酸钙针晶束，轴向排列。形成层明显。

粉末淡紫色或黑褐色。石细胞淡黄色，类圆形、类方形、类长方形、长条形或不规则形，有的一端尖，直径 21～96μm，壁厚至 39μm，有的层纹明显，纹孔及孔沟明显，有的石细胞形大，壁稍厚。草酸钙针晶多成束存在于薄壁细胞中,针晶长至 184μm。

(2)取本品粉末 2.5g，加乙醇 25ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，滤液浓缩至约 1ml，作为供试品溶液。另取巴戟天对照药材 2.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005 年版一部附录Ⅵ B)试验，吸取上述两种溶液各 10μl，分别点于同一硅胶 GF_{254} 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（8:2:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点；喷以 5%氢氧化钠溶液，至斑点显色清晰，显相同颜色的斑点。

【检查】 **杂质** 不得过 2%（《中国药典》2005 年版一部附录Ⅸ A)。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2005 年版一部附录Ⅸ K)。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的冷浸法（《中国药典》2005 年版一部附录Ⅹ A)测定，用水作溶剂，不得少于 40.0%。

【性味与归经】 甘、辛，微温。归肾、肝经。

【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。

【用法与用量】 3～9g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

木 香

Muxiang

本品为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 除去粗皮及须根的干燥根。

【习用名称】 广木香、南木香 云木香。

【处方应配】 写炙木香、炒木香、煨木香均付蜜麸炒木香。

【炮制】 **木香** 将原药除去黑色油只等杂质，略浸，洗净，润透,切厚片，晒或低温干燥，筛去灰屑。

蜜麸炒木香 将生木香用蜜麸拌炒至黄褐色，筛去麸皮。

【性状】 **木香** 本品为类圆形或不规则形切片，直径0.5～5cm。表面灰褐色或黄棕色，可见纵皱纹，切面中部有明显的放射状纹理及裂隙，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，褐色油点（油室）散在。质坚。有特异香气，味苦。

蜜麸炒木香 表面黄棕色至棕色，略具焦香气。