

本品为虎耳草科植物常山 *Dichroa febrifuga* Lour. 除去须根的干燥根。

【习用名称】 鸡骨常山。

【处方应配】 写常山、炙常山均付炒常山。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切薄片，干燥，照清炒法（附录 I）炒至色变深、微具焦斑，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形的片，直径 0.5~2.5cm。外面黄色至黄褐色，易剥落，剥落处露出黄色木部。切面黄色至淡棕黄色，具细密的放射状纹理，有的可见焦斑。质坚硬。气微，具焦香气，味微苦。

【鉴别】 取本品粉末约 2g，加 70%乙醇 10ml，加热回流 15 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 2ml，搅拌，滤过。取滤液，加碘化铋钾试液 2 滴，即生成棕红色沉淀。

【性味与归经】 苦、辛，寒；有毒。归肺、肝、心经。

【功能与主治】 截疟，劫痰。用于疟疾。

【用法与用量】 5~9g。

【注意】 有催吐副作用，用量不宜过大；孕妇慎用。

【贮藏】 置干燥处。

排 草

Paicao

本品为唇形科植物排草香 *Anisochilus carnosus* (L.) Wall. 的干燥带老茎的根。

【习用名称】 香排草。

【炮制】 将原药除去嫩茎，拣去杂质，切短段，筛去灰屑。

【性状】 本品呈段状。根细圆柱形，直径 1~3mm；表面灰褐色，具细皱纹及须根。老茎略呈四棱形，直径 0.8~1.5cm；表面棕褐色，具纵皱纹及残留的根和须根；切面髓部小，中空。质坚韧。气微香，味微辛凉。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 化湿解毒。用于水肿，胸腹胀闷，口臭。

【用法与用量】 3~5g。

【贮藏】 置干燥处。

猫 人 参

Maorenshen

本品为猕猴桃科植物镊合猕猴桃 *Actinidia valvata* Dunn 的干燥根及根茎。

【炮制】 将原药除去杂质。浸 1~2 小时，中途淋水，润透，切厚片。干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则或类圆形的片，直径 1~4cm。表面灰褐色，粗糙，具纵裂纹。切面皮部宽 1~2cm，棕红色，木部黄白色或淡黄棕色，有众多圆形小孔，中央髓部白色。质坚硬。气微，皮部味微苦涩，有刺舌感。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加水 15ml，煮沸 10 分钟，滤过，滤液照下述方法试验：

(1) 取滤液 1ml，置紫外光灯（365nm）下观察，显灰绿色荧光。

(2) 取滤液分置三支试管中，一管中加碘化铋钾试液 2 滴，即生成棕色沉淀；一管中加碘化汞钾试液 2 滴，即生成淡蓝色沉淀；一管中加碘化钾碘试液 2 滴，即生成棕红色沉淀。

【性味】 苦、涩，凉。

【功能与主治】 清热解毒。用于痈疔，脓肿，白带，麻风病。

【用法与用量】 30~120g。

【贮藏】 置干燥处。

猫 爪 草

Maozhacao

本品为毛茛科植物小毛茛 *Ranunculus*