

【功能与主治】 清热解毒，凉血止痢。用于解毒血痢，阴痒带下，阿米巴痢。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

白 术

Baizhu

本品为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 除去须根的干燥根茎。

【习用名称】 台术、於术、生晒术、冬术、冬白术、晒白术、烘术。

【处方应配】 写白术、炒白术、焦白术、炙白术均付蜜麸炒白术。

【炮制】 生白术 将原药除去黑色油只等杂质，浸润，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

蜜麸炒白术 将生白术照麸炒法（附录 I）蜜麸拌炒至微黄色，筛去麸皮。

蜜麸炒所用麸皮为蜜炙麸皮，每生麸皮 100kg，用炼蜜 60kg。

白术炭 将生白术清炒至外焦黑色，内老黄色，筛去灰屑。

制白术 将原药洗净，置蒸具内，蒸至外黑内呈棕褐色，晒或晾至外干内润，切厚片，将蒸时所得汁水拌入，干燥，筛去灰屑。

【性状】 生白术 本品为不规则形或类圆形的切片，直径 1~7cm。表面灰黄色至灰棕色，可见纵向或不规则皱纹及须根痕。生晒者切面淡黄色至淡棕色，具众多小油点，有的可见环纹；烘干者，色较深，角质样，可见放射状纹理或裂隙。气香特异，味甘微辛，嚼之略带粘性。

蜜麸炒白术 切面棕黄色至黄棕色，略具焦香气。

白术炭 本品黑褐色至黑色。体轻，质松脆。折断面黄棕色。气焦香，味苦。

制白术 本品多皱缩不平。表面黑褐色至黑

色。折断面棕褐色。质稍坚韧。气微，味微甜，微苦辛。

【鉴别】 生白术 蜜麸炒白术 (1) 本品粉末淡黄棕色。草酸钙针晶细小，长 10~32 μm ，不规则地聚集于薄壁细胞中，少数针晶直径至 4 μm 。纤维黄色，大多成束，长梭形，直径约至 40 μm ，壁甚厚，木化，孔沟明显。石细胞淡黄色，类圆形、多角形、长方形或少数纺锤形，直径 37~64 μm 。薄壁细胞含菊糖，表面显放射状纹理。导管分子短小，为网纹及具缘纹孔，直径至 48 μm 。

(2) 取本品粉末 0.5g，加正己烷 2ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取白术对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005 年版一部附录 VI B）试验，吸取上述新制备的两种溶液各 10 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90 $^{\circ}\text{C}$)-乙酸乙酯(50:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点，并应显有一桃红色主斑点(苍术酮)。

【检查】 杂质 不得过 2%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX A）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX K）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2005 年版一部附录 IX K）。

【性味与归经】 苦、甘，温。归脾、胃经。

【功能与主治】 健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。本品生用长于燥湿，消痰利水；蜜麸炒用长于健脾燥湿；制用减弱其燥性；炒炭用善于止泻。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

白 芍