

得少于0.30%。

【性味与归经】 苦，寒。归肝经。

【功能与主治】 凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌扑肿痛。本品生用主活血祛瘀，炒炭长于凉血止血。

【用法与用量】 6~9g。

【贮藏】 置干燥处。

茶 树 根

Chashugen

本品为山茶科植物茶 *Camellia sinensis* (L.) O. Ktze. 的干燥根。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形或类圆形的切片，直径1~2.5cm。表皮灰棕色至深棕色，粗糙，具不规则裂纹，外皮易脱落，脱落处露出淡棕黄色木部。切面较平坦，皮部狭，棕色；木部宽广，淡棕黄色，可见同心的环纹。质坚硬。气微，味微苦涩。

【性味与归经】 苦，平。归心、肝、肺经。

【功能与主治】 宁心，利咽，退黄，止泻。用于心悸怔忡，脉象结代，咽喉肿痛，口疮糜碎，黄疸，泻痢。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

草 乌

Caowu

本品为毛茛科植物北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Reichb. 的干燥块根。

【处方应配】 写草乌付制草乌。

【炮制】 生草乌 将原药除去残茎等杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。

制草乌 将生草乌分档，用水浸漂至内无干

心，洗净，置沸水锅内，宽汤煮或蒸至切开内无白心，口尝几无麻或仅微有麻舌感，晒或晾至外干内润，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 生草乌 本品为不规则圆锥形，略弯曲，长2~7cm，直径0.6~1.8cm。顶端常有残茎和少数不定根残基，有的顶端一侧有一枯萎的芽，一侧有一圆形或扁圆形不定根残基。表面灰褐色或黑棕褐色，皱缩，有纵沟纹、点状须根痕和数个瘤状例痕。质硬，断面灰白色或暗灰色，有裂隙，具1多角形或类圆形环纹，髓部较大或中空。气微，味辛辣、麻舌。

制草乌 本品为不规则圆形或近三角形的切片，表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环及点状维管束，并有空隙或空洞，有的呈黑褐色角质状，质坚韧。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。

【鉴别】 生草乌 (1) 本品横切面：后生皮层为7~8列棕黄色栓化细胞；皮层有石细胞，单个散在或2~5个成群，类长方形、方形或长圆形，胞腔大；内皮层明显。韧皮部宽广，常有不规则裂隙，筛管群随处可见。形成层环呈不规则多角形或类圆形。木质部导管1~4列或数个相聚，位于形成层角隅的内侧，有的内含棕黄色物。髓部较大。薄壁细胞充满淀粉粒。

粉末灰棕色。淀粉粒单粒类圆形，直径2~23μm；复粒由2~16分粒组成。石细胞无色，与后生皮层连结的显棕色，呈类方形、类长方形、类圆形、棱形或长条形，直径20~133(234) μm，长至465μm，壁厚薄不一，壁厚者层纹明显，纹孔细，有的含棕色物。后生皮层细胞棕色，表面观呈类方形或长多角形，壁不均匀增厚，有的呈瘤状突入细胞腔。

(2) 取本品粉末0.5g，加乙醚10ml与氨试液0.5ml，振摇10分钟，滤过，滤液置分液漏斗中，加0.25mol/L硫酸溶液20ml，振摇提取，分取酸液适量，用水稀释后，照分光光度法（《中国药典》2005年版一部附录V A）测定，在231nm与275nm