

退黄。用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏,癫痫发狂,黄疸尿赤。川郁金长于活血祛瘀;广郁金疏肝解郁。

【用法与用量】 3~9g。

【注意】 本品不宜与公丁香、母丁香同用。

【贮藏】 置干燥处,防蛀。

金果榄

Jinguolan

本品为防己科植物青牛胆 *Tinospora sagittata*(Oliv.)Gagnep. 或金果榄 *Tinospora capillipes* Gagnep. 的除去须根的干燥块根。

【炮制】 将原药除去杂质,分档,浸洗,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形的切片,直径3~6cm。表面棕黄色或淡褐色,粗糙,有深皱纹。切面淡黄白色,导管束略呈放射状排列,色较深。质坚硬。气微,味苦。

【性味与归经】 苦,寒。归肺、大肠经。

【功能与主治】 清热解毒,利咽,止痛。用于咽喉肿痛,痈疽疔毒,泄泻,痢疾,脘腹热痛。

【用法与用量】 3~9g。外用适量,研末吹喉或醋磨涂敷患处。

【贮藏】 置干燥处,防蛀。

金荞麦

Jinqiaomai

本品为蓼科植物金荞麦 *Fagopyrum dibotrys* (D. Don) Hara 除去须根的干燥根茎。

【习用名称】 开金锁、野荞麦根。

【炮制】 将原药除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片,有的边缘具深凹陷,直径1~4cm。表面棕褐色,有

的略见纵皱纹及须根痕。切面皮部菲薄,棕褐色,木部淡黄棕色至淡棕红色,具放射状纹理与裂隙,髓部小,色较深。质坚硬。气微,味微涩。

【鉴别】 (1)本品粉末淡棕色。淀粉粒甚多,单粒类球形、椭圆形或卵圆形,直径5~48 μ m,脐点点状、星状、裂缝状或飞鸟状,位于中央或偏于一端,大粒可见层纹;复粒由2~4分粒组成;半复粒可见。木纤维成束,直径10~38 μ m,纹孔呈单斜纹孔或十字形纹孔。草酸钙簇晶直径10~62 μ m。木薄壁细胞类方形、椭圆形,直径28~37 μ m,长约至100 μ m,壁厚约5 μ m,胞腔可见稀疏的纹孔。具缘纹孔及网纹导管直径21~83 μ m。

(2)取本品2.5g,加甲醇20ml,放置1小时,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液浓缩至约5ml,作为供试品溶液。另取金荞麦对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录VI B)试验,吸取上述供试品溶液5~10 μ l,对照药材溶液5 μ l,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-甲酸(1:2:0.2:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以25%磷钼酸乙醇溶液,在110 $^{\circ}$ C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】 总灰分 不得过4.0%(《中国药典》2005年版一部附录IX K)。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的热浸法(《中国药典》2005年版一部附录X A)测定,用稀乙醇作为溶剂,不得少于13.0%。

【性味与归经】 微辛、涩,凉。归肺经。

【功能与主治】 清热解毒,消痈利咽,祛风湿。用于肺痈咳吐脓血,咽喉肿痛,肺热咳嗽,风湿痹痛。

【用法与用量】 9~30g。

【贮藏】 置干燥处,防霉,防蛀。

金雀根