

1ml, 置水浴中加热, 生成棕红色沉淀。

【检查】 总灰分 不得过 5.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K)。

【性味与归经】 甘, 寒。归肺、胃、膀胱经。

【功能与主治】 凉血止血, 清热利尿。用于血热吐血, 衄血, 尿血, 热病烦渴, 黄疸, 水肿, 热淋涩痛, 急性肾炎水肿。本品鲜用长于清热生津; 炒炭用优于止血。

【用法与用量】 9~30g, 鲜品 30~60g。

【贮藏】 置干燥处。鲜品置阴凉处, 防腐烂。

白 前

Baiqian

本品为萝藦科植物柳叶白前 *Cynanchum stauntonii* (Decne.) Schltr. ex Levl. 或芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand. -Mazz. 的干燥根茎及根。

【处方应配】 写炙白前付蜜白前。

【炮制】 白前 将原药除去残茎等杂质。洗净, 润透, 切短段, 干燥, 筛去灰屑。

炒白前 将白前, 照清炒法 (附录 I) 清炒至微具焦斑, 筛去灰屑。

蜜白前 将白前, 照蜜炙法 (附录 I) 用炼蜜拌炒至蜜汁吸尽。

每白前 100kg, 用炼蜜 25kg。

【性状】 白前 本品全体为黄白色至黄棕色 (柳叶白前), 或灰绿色至灰黄色 (芫花叶白前)。根茎呈细长圆柱形段状, 有分枝, 直径 1.5~4mm。表面可见节及细短须根; 切面黄白色, 中空, 质脆, 易折断。根纤细, 在表面具细微纵皱纹, 节处簇生, 直径不及 1mm, 切面黄白色。气微, 味微甜。

炒白前 表面淡棕黄色, 有的可见焦斑, 具焦香气。

蜜白前 表皮棕黄色至黄棕色, 滋润而不粘手, 有蜜糖香气, 味甜、微涩。

【鉴别】 取本品粗粉 1g, 加 70%乙醇 10ml,

加热回流 1 小时, 滤过。取滤液 1ml, 蒸干, 残渣加醋酐 1ml 使溶解, 再加硫酸 1 滴, 柳叶白前显红紫色, 放置后变为污绿色; 芫花叶白前显棕红色, 放置后不变色。

【性味与归经】 辛、苦, 微温。归肺经。

【功能与主治】 降气, 消痰, 止咳。用于肺气壅实, 咳嗽痰多, 胸满喘急。本品炒用取其中和, 蜜炙用取其润肺。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处。

白 药 子

Baiyaozi

本品为防己科植物头花千金藤 *Stephania cepharantha* Hayata 除去须根的干燥块根。

【习用名称】 白药脂。

【炮制】 将原药除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥, 筛去灰屑。原药为块片者, 除去杂质及灰屑, 洗净, 略润, 切丝 (宽 3~5mm), 干燥, 筛去灰屑。

【性状】 本品为类圆形或不规则形的切片或丝条, 片状者直径 2~7cm。表面灰棕色至暗褐色, 具不规则皱纹, 有的可见须根痕。切面黄白色至淡黄色, 具筋脉点及筋脉纹。质坚脆, 粉性。气微, 味苦。

【鉴别】 取本品粗粉 5g, 加乙醇 25ml, 置水浴上回流 10 分钟, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加稀盐酸 2ml 使溶解, 滤过。取滤液 1ml, 加碘化汞钾试液 2 滴, 生成大量黄白色沉淀。

【性味与归经】 苦、辛, 凉。归脾、肺、肾经。

【功能与主治】 清热解毒, 化痰散瘀, 止咳, 止血。用于痈疽肿毒, 瘰疬, 咽喉肿痛, 跌扑肿痛, 咳嗽, 吐血, 衄血, 外伤出血。

【用法与用量】 9~15g。酒泡治跌扑肿痛。