通常为 1粒,黑色肾形，皱缩。气微，味甜而微苦、涩。

【鉴别】 取本品粉末0.5g，加甲醇20ml,加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇-三氯甲烷（3∶2）混合溶液1 ml使溶解,作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品,加乙醇制成每1 ml含1 mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录Ⅵ B）试验，吸取供试品溶液3～5μl，对照品溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮-乙酸乙酯（5∶2∶1）为展开剂，展开,取出,晾干,喷以硫酸乙醇溶液（1→10）,在110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【性味与归经】 甘、苦，凉。归肝、肾经。

【功能与主治】 滋补肝肾，明目乌发。用于眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明。

【用法与用量】 6～12g。

【贮藏】 置干燥处。

小　茴　香

Xiaohuixiang

本品为伞形科植物茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.的干燥成熟果实。

【习用名称】 西小茴、瘪角茴香。

【处方应配】 写茴香付小茴香。

【炮制】 将原药除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长4～8mm，直径1.5～2.5mm。表面黄绿色或淡黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。

【鉴别】(1)本品分果横切面：外果皮为 1 列扁平细胞，外被角质层。中果皮纵棱处有维管束，其周围有多数木化网纹细胞；背面纵棱间各有大的椭圆形棕色油管1个,接合面有油管2个，共6个。内果皮为1列扁平薄壁细胞，细胞长短不一。种皮细胞扁长，含棕色物。胚乳细胞多角形，含多数糊粉粒，每个糊粉粒中含有细小草酸钙簇晶。

(2)取本品粉末2g，加乙醚20ml，超声处理10分钟，滤过，滤液挥干，残渣加三氯甲烷1ml使溶解，作为供试品溶液。另取茴香醛对照品，加乙醇制成每1ml含1μl的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录Ⅵ B)试验，吸取供试品溶液5μl、对照品溶液1μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以石油醚(60～90℃)－乙酸乙酯(17∶2.5)为展开剂，展至 8cm，取出，晾干，喷以二硝基苯肼试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙红色斑点。

【检查】 **杂质**　不得过2%（《中国药典》2005年版一部附录Ⅸ A)。

总灰分　不得过8.0%（《中国药典》2005年版一部附录Ⅸ K)。

【含量测定】 照挥发油测定法（《中国药典》2005年版一部附录Ⅹ D）测定。

本品含挥发油不得少于1.5%(ml/g)。

【性味与归经】 辛，温。归肝、肾、脾、胃经。

【功能与主治】 散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液。

【用法与用量】 3～6g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

山　茱　萸

Shanzhuyu

本品为山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 沸水焯后的干燥成熟果肉。