

或淡灰黑色，残留外皮棕褐色或灰黑色，切面多裂隙或中空，有的可见放射状纹理。质坚，角质状，或具纤维性。气微，味淡。

**【鉴别】 生甘遂** (1)本品粉末类白色。淀粉粒甚多，单粒球形或半球形，直径5~34 $\mu\text{m}$ ，脐点点状、裂缝状或星状；复粒由2~8分粒组成。无节乳管含淡黄色微细颗粒状物。厚壁细胞长方形、梭形、类三角形或多角形，壁微木化或非木化。具缘纹孔导管多见，常伴有纤维束。

(2)取本品粉末1g，加乙醇10ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取甘遂对照品药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录VI B)试验，吸取上述二种溶液各2 $\mu\text{l}$ ，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以甲苯-丙酮(10:06)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以硫酸乙醇溶液(1→10)，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】 总灰分** 不得过3.0%(《中国药典》2005年版一部附录IX K)。

**酸不溶性灰分** 不得过1.0%(《中国药典》2005年版一部附录IX K)。

**【浸出物】 生甘遂** 照浸出物测定法项下的热浸法(《中国药典》2005年版一部附录X A)测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于17.0%。

**【性味与归经】** 苦，寒；生品有毒。归肺、肾、大肠经。

**【功能与主治】** 泻水逐饮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利。

**【用法与用量】** 0.5~1.5g。

**【注意】** (1)生甘遂系毒性中药，应遵照《医疗用毒性药品管理办法》的有关规定使用。

(2)孕妇禁用，体虚者慎用，不宜与甘草同用。

**【贮藏】** 置干燥处，防蛀。

## 生 姜 Shengjiang

本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 除去须根的新鲜根茎。

**【习用名称】** 鲜生姜、鲜姜。

**【处方应配】** 写生姜1片付生姜1.5g，写煨姜付煨生姜。

**【炮制】 生姜** 用时将原药洗净，拭干，切厚片。

**煨生姜** 将原药洗净，照煨法(附录I)，置文火上煨，至草纸外呈焦黑，生姜煨熟为度。

**姜粉** 将鲜老生姜洗净，加水适量，捣烂取汁，滤去残渣，静置沉淀，取其沉淀物，干燥，研细。

**【性状】 生姜** 本品呈不规则形块状，略扁，具指状分枝，长4~18cm，厚1~3cm。表皮灰黄色，可见明显的环节，具纵皱纹及纵沟纹。分枝顶端有茎痕或芽。切面淡黄色，散有众多筋脉小点。质脆，易折断，气香特异，味辛辣。

**煨生姜** 表面呈黄褐色，具焦斑，切面暗黄色，略有焦气。

**姜粉** 本品为类白色细粉。气微香特异，味淡而微辣。

**【检查】 微生物限度 姜粉** 应符合规定(《中国药典》2005年版一部附录XIII C)。

**【性味与归经】** 辛，微温。归肺、胃、脾经。

**【功能与主治】** 解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽；煨生姜长于和中止呕。姜粉温中散寒，用于阳气虚衰，虚寒泄泻，寒冷腹痛，寒痰咳嗽。

**【用法与用量】** 3~9g。**姜粉** 多入成药制剂。

**【贮藏】** 生姜春冬季埋沙泥中，防冻；夏秋季置阴凉处，防止腐烂。煨生姜置阴凉干燥处。姜粉 密闭，置干燥处。

## 白 及