

于0.24%。

【性味与归经】 甘、辛，凉。归脾、胃经。

【功能与主治】 解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，高血压颈项强痛。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

臭梧桐根

Chouwutonggen

本品为马鞭草科植物海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb. 的干燥根。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为不规则形或类圆形的切片，直径1~3cm。表面灰棕色至暗棕色，粗糙，外皮多数已脱落。切面黄白色至淡黄棕色，有的可见细密的放射状纹理及多列同心性环纹。质坚硬。气微，味淡。

【性味】 苦，寒。

【功能与主治】 祛风，活血。用于风湿痛，跌打损伤，高血压。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

莪术

Ezhu

本品为姜科植物蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val.、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S.G. Lee et C.F. Liang 或温郁金 *Curcuma wenyujin* Y.H. Chen et C. Ling 除去须根，经煮或蒸透后的干燥根茎。后者习称“温莪术”。

【习用名称】 蓬术、蓬莪术。

【炮制】 将原药除去杂质，分档，浸透，洗净，

置蒸具内，蒸软，趁热切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品为圆形、类圆形或不规则形的薄片，直径1~4cm。表面灰黄色至棕褐色，可见不规则皱纹、残留的须根及须根痕或环节。切面黄棕色至棕褐色，蜡样，常附有淡黄色至灰棕色的粉末，皮层与中柱易分离，具1黄白色或棕褐色环纹，散有众多筋脉小点。质坚实，易碎。气微香，味微苦而辛。

【检查】吸光度 精密称取本品中粉30mg，加三氯甲烷10ml，超声处理40分钟或浸泡24小时，滤过，滤液转移至10ml量瓶中，加三氯甲烷至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（《中国药典》2005年版一部附录V A）测定，在242nm波长处有最大吸收，吸光度不得低于0.32。

总灰分 不得过6.5%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

酸不溶性灰分 不得过1.5%（《中国药典》2005年版一部附录IX K）。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》2005年版一部附录X A）测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于6.0%。

【性味与归经】 辛、苦，温。归肝、脾经。

【功能与主治】 行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛；早期宫颈癌。

【用法与用量】 6~9g。

【注意】 孕妇禁用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

铁包金

Tiebaojin

本品为鼠李科植物铁包金 *Berberis lineata* (L.) DC. 的干燥根。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，略润，切厚片，干燥，筛去灰屑。来货为片子，除去杂质，筛去灰屑。

【性状】 本品呈类圆形或不规则的片状。外