

**【性状】鲜芦根** 本品呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径1~2cm。表面黄白色，有光泽，外皮疏松可剥离，节呈环状，有残根及芽痕。切断面黄白色，中空，壁厚1~2mm，有小孔排列成环。体轻，质韧，不易折断。气微，味甘。

**干芦根** 本品为圆柱形的段，直径1~2cm，多压扁。表面淡黄色至淡棕黄色，可见节与根痕，节处较硬，节间具纵皱纹。切面黄白色至淡棕黄色，中空，周边有小孔排列成环，节处可见髓隔。体轻，质韧。气微，味微甜。

**【鉴别】** 取本品粉末1g，加三氯甲烷10ml，超声处理20分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取芦根对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005年版一部附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各10 $\mu$ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚（30~60 $^{\circ}$ C）-甲酸乙酯-甲酸（15：5：1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

**【性味与归经】** 甘，寒。归肺、胃经。

**【功能与主治】** 清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。鲜品清热生津效力尤佳。

**【用法与用量】** 15~30g，鲜品用量加倍，或捣汁用。

**【贮藏】** 干芦根置干燥处；鲜芦根埋于湿沙中，防冻、防烂。

## 苍 术

Cangzhu

本品为菊科植物茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 或北苍术 *Atractylodes chinensis* (Bunge) Koidz. 除去须根的干燥根茎。

**【习用名称】** 北苍术、茅苍术、苍茅术、茅术、

南京术、穹窿术。

**【处方应配】** 写苍术、炙苍术、炒苍术、焦苍术、茅术、炙茅术、炒茅术、焦茅术均付蜜麸炒苍术。

**【炮制】生苍术** 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

**蜜麸炒苍术** 取生苍术照麸炒法（附录I）用蜜炙麸皮拌炒至棕黄色，筛去麸皮。

**制苍术** 将原药除去杂质，洗净，略润，置蒸具内，蒸至外黑色内棕褐色，晒或晾至外干内润，切厚片，将蒸时所得汁水拌入，使之吸尽，干燥，筛去灰屑。

**米泔水苍术** 将原药除去杂质，用米泔水浸30分钟，洗净，润透，切厚片，干燥，用蜜炙麸皮拌炒至棕黄色，筛去麸皮。

**米泔水制备** 每大米100kg，用水淘取米泔水500kg。

**【性状】生苍术** 本品为类圆形或不规则形的切片，直径1~4cm。表面灰棕色、黄棕色至黑棕色，粗糙，可见皱纹、横曲纹，具众多残留须根及须根痕。切面黄白色至淡黄色或灰白色，散有众多橙黄色或红棕色油点（习称朱砂点），有的可见筋脉纹和细裂隙。久存有时可见析出白色细针状结晶。质稍坚，较松，香气特异或较淡，味辛、苦或味微甘、微苦。

**蜜麸炒苍术** 切面棕黄色至黄棕色，散在的油点呈棕色，略具焦香气。

**制苍术** 本品为类圆形或不规则形的切片，多皱缩不平，直径1~4cm。黑褐色至黑色。质稍松韧。折断面棕褐色。气微，味微甜、微苦辛。

**米泔水苍术** 与蜜麸炒苍术相似。

**【鉴别】生苍术** (1) 本品粉末棕色。草酸钙针晶细小，长5~30 $\mu$ m，不规则地充塞于薄壁细胞中。纤维大多成束，长梭形，直径约至40 $\mu$ m，壁甚厚，木化。石细胞甚多，有时与木栓细胞连结，多角形、类圆形或类长方形，直径20~80 $\mu$ m，壁极厚。菊糖多见，表面呈放射状纹理。