

【性味与归经】 苦，寒。归肝、胆经。

【功能与主治】 清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，强中，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。

【用法与用量】 3~6g。

【贮藏】 置干燥处。

## 伊 贝 母

Yibeimu

本品为百合科植物新疆贝母 *Fritillaria walujewii* Regel 或伊犁贝母 *Fritillaria pallidiflora* Schrenk 除去须根及外皮的干燥鳞茎。

【习用名称】 新疆贝母。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈类圆形、肾形、细条形或不规则形的片状，直径1~2.5cm，厚1~2mm。外表面类白色至淡棕黄色，有的可见棕褐色基部和稍尖的顶端。切面类白色，粉性，有的可见中间微凹的长条形浅槽或心芽。质坚脆。气微，味微苦。

【鉴别】 (1)本品粉末类白色，以淀粉粒为主体。

**新疆贝母** 淀粉粒单粒广卵形，卵形或贝壳形、直径5~54 $\mu$ m，脐点点状、人字状或短缝状，层纹明显；复粒少，由2分粒组成。表皮细胞类长方形，垂周壁微波状弯曲，细胞内含细小草酸钙方晶。气孔不定式，副卫细胞4~6。螺旋纹及环纹导管直径9~56 $\mu$ m。

**伊犁贝母** 淀粉粒单粒广卵形、三角状卵形、贝壳形或不规则圆形，直径约至60 $\mu$ m，脐点点状、人字状或十字状。导管直径约50 $\mu$ m。

(2)取本品粉末5g，加浓氨试液2ml与三氯甲烷20ml，振摇，放置过夜，滤过，滤液蒸干，残渣加三氯甲烷0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取

伊贝母对照药材5g，同法制成对照药材溶液。再取西贝母碱对照品，加三氯甲烷制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2005年版一部附录VI B)试验，吸取上述三种溶液各2~4 $\mu$ l，分别点于同一用2%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(8:8:3:2)10℃以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，依次喷以稀碘化铋钾试液和亚硝酸钠试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同的棕色斑点。

【检查】 总灰分 不得过4.5%(《中国药典》2005年版一部附录IX K)。

酸不溶性灰分 不得过0.9%(《中国药典》2005年版一部附录IX K)。

【浸出物】 照浸出物测定法项下的冷浸法测定(《中国药典》2005年版一部附录X A)，用70%乙醇作溶剂，不得少于8.0%。

【性味与归经】 苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功能与主治】 清热润肺，化痰止咳。用于肺热咳嗽，干咳少痰，阴虚劳嗽，咳痰带血。

【用法与用量】 3~9g。

【注意】 本品不宜与乌头类药材同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

## 关 白 附

Guanbaifu

本品为毛茛科植物黄花乌头 *Aconitum coreanum* (Lévl.) Rapaics 的干燥根。

【习用名称】 竹节白附子。

【处方应配】 写关白附付制关白附。

【炮制】 **生关白附** 将原药除去残茎、泥屑等杂质，洗净，取出，干燥。

**制关白附** 将生关白附置缸内，加水超出药面约20cm，浸漂5~7天(夏、秋季须在阴凉处浸漂)，