

酸不溶性灰分 不得过 1.0% (《中国药典》2005 年版一部附录 IX K) 2.0%。

【性味】 微苦、辛，平。

【功能与主治】 解毒消肿，活血止痛，祛风除湿。用于咽喉肿痛，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处。

百 合

Baihe

本品为百合科植物卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb. 百合 *Lilium brownii* F. E. Brown ex Mieliez var. *viridulum* Baker 或细叶百合 *Lilium pumilum* DC. 经沸水略烫后干燥的肉质鳞叶。

【习用名称】 杜百合、野百合。

【处方应配】 写炙百合付蜜百合。

【炮制】 百合 将原药除去黑色油瓣等杂质，筛去灰屑。

蜜百合 取百合，照蜜炙法（附录 I）炒至不粘手。

每 100kg 百合，用炼蜜 5kg。

【性状】 百合 本品为长椭圆形，长 2~5cm，宽 0.5~2cm，中部厚 1.3~4mm。表面类白色、淡棕黄色或微带紫色，有数条纵直平行的白色维管束。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。气微，味微苦。

蜜百合 淡棕黄色，滋润，略有光泽，有蜜糖香气，味微甜、微苦。

【鉴别】 百合 取本品粉末 1g，加甲醇 10ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取百合对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005 年版一部附录 VI B）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-

乙酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 磷钼酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【浸出物】 百合 照浸出物测定项下的冷浸法（《中国药典》2005 年版一部附录 X A）测定，用水作溶剂，不得少于 18.0%。

【性味与归经】 甘、寒。归心、肺经。

【功能与主治】 养阴润肺，清心安神，用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。本品蜜炙增强润肺作用。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置干燥处。

百 部

Baibu

本品为百部科植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Miq. 蔓生百部 *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 或对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour. 除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至无白心的干燥块根。

【处方应配】 写炙百部付蜜百部。

【炮制】 百部 将原药除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

蒸百部 将百部置蒸具内，上气后蒸 1 小时，取出，干燥，筛去灰屑。

蜜百部 取百部，照蜜炙法（附录 I）炒至不粘手。

每 100kg 百部，用炼蜜 12.5kg。

【性状】 百部 本品为不规则片、或不规则条形的斜片，直径 0.3~2cm。表面黄白色或淡棕黄色，可见深纵皱纹。切面淡黄棕色或黄白色至暗棕色，角质样，皮部较厚，中柱扁缩。质韧软。气微，味甘、苦。

蒸百部 表皮黄褐色至黄棕色，切面淡黄棕