

## 大风子

### Dafengzi

本品为大风子科植物大风子 *Hydnocarpus anthelminthica* Pierr. ex Gagnep. 的干燥成熟种子。

**【处方应配】** 写大风子，内服付大风子霜；外用付大风子仁。

**【炮制】** 大风子仁 将原药除去杂质，筛去灰屑。用时去壳取仁，除去黑色油粒。

大风子霜 将大风子仁研成粗粉，照炮制通则制霜项下去油成霜法（附录 I）制霜。

**【性状】** 大风子仁 去壳前，本品略呈不规则卵圆形或多面形，长 1.0~2.5cm，宽 1~2cm；外表面灰棕色至黑棕色，具细皱纹，较小一端有的可见凹纹射出；种壳坚硬，厚 1.5~2mm，内表面淡黄色至淡棕黄色；内含种仁 1 粒，富油性。去壳后，种仁表面红棕色至暗棕色，内部类白色至淡黄色。气微，味淡。

大风子霜 本品呈淡黄色至淡棕黄色的松散粉末。微具油腻气，味淡。

**【鉴别】** 大风子仁 (1) 本品横切面：去壳前，种皮全为石细胞；外层石细胞类圆形或多边形，具孔沟，有的含草酸钙棱晶；中层为胞壁较厚的长条状石细胞层，胞腔呈线缝状，沟纹细密；内层石细胞切向排列，呈长条形或一端稍尖、另端稍膨大，胞腔稍大或呈线缝状，孔沟明显。种仁外侧为 4~5 列红棕色扁平细胞，其内为胚乳组织。

(2) 取本品 10g，切碎，加乙醚 50ml，浸渍 4 小时，倾取乙醚液，挥去乙醚，得大风子油。取油 3 滴，加三氯甲烷 0.5ml 及冰醋酸 1.5ml，再加硫酸约 2 滴，放置过夜，下层呈紫色或紫褐色。

**【性味与归经】** 辛，热；有毒。归肝、肾、脾经。

**【功能与主治】** 祛风攻毒，杀虫止痒。用于麻风，疥癣。

**【用法与用量】** 大风子仁 1.5~3g；大风子霜 0.3~1g，包煎，多入成药制剂。

**【注意】** 本品内服宜慎，不宜过量和持续服用。

**【贮藏】** 置阴凉干燥处；霜置阴凉密闭处。

## 大豆卷

### Dadoujuan

本品为豆科植物大豆 *Glycine max* (L.) Merr. 的成熟黑色种子，经发芽后的干燥品。

**【习用名称】** 大豆黄卷、豆黄卷、清水豆卷、清豆卷。

**【炮制】** 将原药除去杂质，筛去灰屑。

**【性状】** 本品呈椭圆形或略呈肾形，略扁，长 0.8~1.6cm，宽约 0.6cm。表面棕褐色至黑褐色或黑色，稍具光泽，一侧有长圆形种脐，种皮均已裂开，有的具横皱纹。除去种皮，可见子叶 2 枚，黄绿色或黄色，肥厚，胚根细长，弯曲，长约 1cm。气微，味淡，嚼之有豆腥气。

**【检查】** 出芽率 取本品 50g，按药材取样法（附录 IV）取对角两份样品，检查出芽粒数与总粒数，计算出芽率（%）。

本品出芽率不得少于 85%。

**【性味与归经】** 甘，平。归脾、胃、肺经。

**【功能与主治】** 透表，利湿，解热。用于暑湿，湿温，发热烦躁，胸闷，肢体酸重，水肿，小便不利。

**【用法与用量】** 9~15g。

**【贮藏】** 置干燥处，防霉，防蛀。

## 大枣

### Dazao

本品为鼠李科植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的干燥成熟果实。