

本品为茜草科植物水杨梅 *Adina rubella* (Sieb. et Zucc.) Hance 的干燥根切片。

【炮制】 将原药除去杂质，洗净，润透，改刀切碎（不大于1cm），干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈不规则丝、块状，大小、厚薄、粗细不一。栓皮灰褐色，有时脱落而显现棕色的光滑皮部。皮部黄棕色，纤维性强，厚2~5mm，有时与木部分离。切面木部发达，多为浅黄色，少数心材棕黄色。坚硬，气微，味微苦。

【性味】 淡，平。

【功能与主治】 清热解毒，散瘀活血。用于肺热咳嗽。

【用法与用量】 50~100g；外用捣敷。

【贮藏】 置干燥处。

片姜黄

Pianjianghuang

本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 趁鲜纵切后的干燥根茎切片。

【炮制】 将原药除去杂质，快洗，切丝（宽2~3mm），干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品呈丝条状，有的卷曲，长短不一，长可达6cm。表面灰黄色，具不规则皱纹，有的可见残留的须根、须根痕及环节。切面灰白色、黄白色至棕黄色，略粗糙，可见散在的筋脉小点。质脆而坚实，略粉质。气香特异，味微苦而辛凉。

【鉴别】 取本品粉末1g，加石油醚（30~60℃）5ml，时时振摇，约30分钟，滤过，滤液加石油醚至5ml，作为供试品溶液。另取片姜黄对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2005年版一部附录VI B）试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（30~60℃）-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液，在100℃

加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【含量测定】 照挥发油测定法（《中国药典》2005年版一部附录X D甲法）测定。

本品含挥发油不得少于0.8%（ml/g）。

【性味与归经】 辛、苦，温。归肝、脾经。

【功能与主治】 破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，肩臂疼痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 3~9g。

【注意】 孕妇慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防蛀。

备注：本市习惯处方“姜黄”付“片姜黄”。

牛膝

Niuxi

本品为苋科植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Bl. 的干燥根。

【习用名称】 淮牛膝，怀牛膝。

【处方应配】 写炒牛膝付盐炒牛膝。

【炮制】 牛膝 原药除去残留的芦头（根茎）、油黑条等杂质，快洗，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。

盐炒牛膝 取牛膝，照炒法（附录I）用盐拌炒至鼓起，筛去食盐。

牛膝炭 取牛膝，照炒法（附录I）清炒至外焦黑色，内棕褐色，筛去灰屑。

【性状】 牛膝 本品呈圆柱形的段状，直径2~10mm。表面灰黄色或淡棕色，具细纵皱纹及须根痕，有的可见横向皮孔样的突起。切面淡棕色，微呈角质样而油润，中心维管束木部较大，黄白色，其外周散有少数黄白色点状维管束，断续排列成2~4轮。质紧密而硬脆，受潮显软性。气微，味微甜而稍苦涩。

盐炒牛膝 表面黄棕色至暗黄棕色，微鼓起，有的具焦斑，质较松，略具焦香气，稍带咸味。