

于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以石油醚(30~60℃)-丙酮-乙酸乙酯(19:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以间苯三酚盐酸试液。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙色至橙红色斑点。

【含量测定】照挥发油测定法(《中国药典》2005年版一部附录X D)测定。

本品含挥发油不得少于4.0%(ml/g)。

【性味与归经】辛,温。归肝、肾、脾、胃经。

【功能与主治】温阳散寒,理气止痛。用于寒疝腹痛,肾虚腰痛,胃寒呕吐,脘腹冷痛。

【用法与用量】3~6g。

【贮藏】置阴凉干燥处。

刀 豆

Daodou

本品为豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。

【习用名称】刀豆子。

【炮制】将原药除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。

【性状】本品为长卵形或不规则形的切片,有的外皮已脱落,长2~3.5cm,宽1~2cm。切面黄白色,外皮薄,易脱落。质硬。气微,味淡,嚼之有豆腥味。

【鉴别】本品横切面:表皮为1列栅状细胞,种脐处2列,外被角质层,光辉带明显。支持细胞2~6列,呈哑铃状。营养层由十多列切向延长的薄壁细胞组成,内侧细胞呈颓废状;有维管束,种皮下方为数列多角形胚乳细胞。子叶细胞含众多淀粉粒。管胞岛椭圆形,壁网状增厚,具缘纹孔少见。

周围有4~5层薄壁细胞,其两侧为星状组织,细胞呈星芒状,有大形的细胞间隙。

【性味与归经】甘,温。归胃、肾经。

【功能与主治】温中,下气,止呃。用于虚寒呃逆,呕吐。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置干燥处,防蛀。

刀 豆 壳

Daodouke

本品为豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. 除去种子的干燥成熟果荚。

【炮制】将原药除去杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。

【性状】本品为卷曲的段,宽3~5mm。外表面淡棕色至黄棕色,具皱纹及粗筋脉,散生黑色斑点,并可见斜向细条纹。内表面淡黄色至淡黄棕色,平滑而略有光泽。质坚。气微,味淡。

【性味】甘,温。

【功能与主治】止泻,通经。用于久痢,经闭。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置干燥处。

万 年 青 子

Wannianqingzi

本品为百合科植物万年青 *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth 的干燥成熟果实。

【炮制】将原药除去杂质,筛去灰屑。

【性状】本品呈类球形或不规则形多面体,有的已压扁,直径0.8~1.6cm。表面棕褐色至黑褐色,皱缩,顶端具淡棕色残存的三角形花柱基,基部可见果柄痕;果皮紧贴种子。种子1~5粒,通常一粒,略呈卵形,直径5~7mm;表面深棕色至棕黑